

PHORHASIS PHILO  
SOPHI TRACTATVS NO  
NVS AD REGEM ALMANSOREM,  
de curatione morborū particularium: opu  
sculum huic sæculo accommodatissimum.



PARISIIS  
Apud Simonem Colinæum.  
I 5 3 4

**DOMINI RHASIS**  
**MAGNI MEDICI NONVS**  
**TRACTATVS AD REGEM AL-**  
**mansorem, de curatione morborum par-**  
**ticularium.**

**De Soda, Cephelea & Hemicrania. Cap. I.**



Vando rubedo & tēſio  
 & grauedo in facie &  
 oculis cum æſtu affue-  
 rint, & tactus calidus  
 ſentitur, & pulſus fue-  
 rit magnus, ex cepha-  
 lica facienda eſt phlebo-  
 tomia in parte, in qua  
 eſt dolor, vel in qua do-  
 lor magis infeſtat. Deinde aqua roſata & oleū  
 roſatum & acetum ſumantur, & ſimul mixta  
 agitētur donec inſpiſſentur, & ſuper niuem in-  
 frigidata, ſuper caput fundantur. Æger vero à  
 carne abſtineat & à vino, & comedat adeziam  
 citrinam & tapſil, & olera frigida ac fructus fri-  
 gidos. Vēter autem ſoluatur ex mirobalanis ci-  
 trinis & prunis ac tamarindis & zuccaro albiſ-  
 ſimo. Quòd ſi iſta nō ſuffecerint, ſemina malua-  
 uiſci in aceto poſita agitentur quouſq; ad ſpiſſi-  
 tudinem perueniant, ex quibus emplaſtrum ca-  
 piti ſupponatur. Ex pſyllio quoq; & aceto em-  
 plaſtrum fieri vtile eſt. Si autē cū iſtis fuerit in-  
 pulſu velocitas, & in tactu ſentitur caliditas, ſed

neq; in facie, neq; in oculis fuerit rubedo neque  
 tensio, in principio soluat<sup>ur</sup> venter. Deinde fiat  
 quæ diximus. Naribus autem iniiciatur oleum  
 violarum, aut oleum cucurbitæ dulcis, aut nenu-  
 faris oleum, aut oleum de floribus salicis, quorū  
 quodlibet super nūem infrigidatum capiti su-  
 perfundatur, & nutriatur vt prædiximus. Æger  
 verò odoret camphoram, & aquam rosatam &  
 salices & violas, & his similia. Quòd si ægritu-  
 do multū inuale scat, sumatur opij & campho-  
 ræ vniuscuiusque quantum ponderant duo gra-  
 na hordei, quæ dissoluta in oleo de salicib<sup>9</sup>, mit-  
 tantur in nares & aures. Quòd si cum soda nō  
 fuerit aliquid eorum quæ diximus de rubedine  
 in facie, fueritq; ægritudo antiqua, in principio  
 venter cum pilulis cochijs soluat<sup>ur</sup>, quas ego fe-  
 ci. Pilulæ cochiae. & pulueris pigræ drachmas de-  
 cem, coloquintidæ drachmas tres, & tertiam,  
 scamoneæ drachmas duas, & turbith, sticados,  
 ana drachmas quinque: fiant pilulæ ex istis, &  
 sunt doses decem. Postquam verò venter solu-  
 tus fuerit, infundatur caput ex oleo sambacino,  
 & oleo de ben, & mittatur in aures. Æger quo-  
 que odoret algaliam & insuffletur muscus nari-  
 bus. Quòd si ægritudo multum infestauerit, su-  
 matur euphorbij & castorei, amborū ana sex-  
 ta pars drachmæ vnius. Et dissoluta in pauco  
 oleo sambacino mittantur in nares & aures. In  
 cephaleo verò calida, emplastrum hoc fronti &  
 temporibus est imponendum. Emplastrum in  
 cephalea calida. & semen lactucarum sief me-  
 mithe, sandalum rubeum & album, faufel, ro-  
 sas, opium, fiat ex eis emplastrum postquam

aceto & aqua rosata conspersa fuerint, & fronti imponatur, super quod mittatur pānus aceto & aqua rosata infusus. Qui cum tepesfactus fuerit, iterum infundatur & desuper ponatur. Linimentum verò cephalicę frigidę. & castoreum, euphorbium, piper, sinapim, storacem, rutam, marrubium, quę siccata & puluerizata & triconizata misceantur, & conspergantur vino veteri, ex quibus fiant trocisci, & desiccentur. Cūq; necesse fuerit, ex vno in vino veteri, aut oleo costino vel camomillino dissoluto frons multo: tiens liniatur. Hoc enim linimentum omni antiquę cephalę confert, non solum superpositum, sed etiam auri iniectum, quę sequitur illud tempus postquam in aliquo de prædictis oleis resolutum fuerit. Ægro verò vinum vetus & forte dandum est. Cum autem cephalęa per hebdomadam vnā perseuerauerit, Æger in balneum mittendus est, atque super caput ipsius aqua in qua camomilla & sansucus, & sticados arabicus, & nemen cocta fuerint simul aut sigillatim, fundenda est. Quòd si cephalęa quotidie ante comestionem inuadat & post comestionem recedat, succurrendum est infirmo ante horam, qua venire consuevit, dando ei buccellas panis in succo granatī aut vixæ acerbę, aut horum similium infusas. Si autem cephalęa contingat propter multam in sole moram, sufficienter ex oleo rosato & aceto infrigidatis curari poterit. Quę tamen, si ex hoc non quieuerit, ex alijs infrigidantibus curanda erit. Si autē adhuc soda perseuerauerit, & fortior fiat, neque villo modo remoueatur: & timeatur ne æger vis

sum amittat, & aqua ad oculos descendat temporum arteriæ sunt incidendæ & extrahendæ. Hoc tamen, quod nunc loquimur, est præter nostram intentionem in hoc libro.

## De Scotomia &amp; vertigine.

## Caput II.

**C**um aliquis illud quod ante eum est, circulariter moueri viderit, & oculi tenebrescunt, & cadere voluerit, & facies & oculi rubuerint in eadem hora, venæ quoque quæ sunt post aures grossæ apparuerint, ex ipsis venis facienda est phlebotomia, & ventosæ in collo & tibijs sunt ponendæ. Quod si prædictæ non apparuerint venæ, & facies fuerit rubea, sanguis ex basilica erit minuendus, & ventosæ in tibijs erunt ponendæ. In hac præterea scotomiæ specie, & in ea quam antè diximus, caput ex oleo rosato & aceto est infundendum. Æger quoque calida cibaria vitare debet. Venter verò ex apozimate mirobalanorum citrinorum, quod in capitulo de cephalea diximus, soluendus est. Cum autem neque in facie rubedo, neque febris cum scotomia fuerit, attendendum est an sit stomachi subuersio & nausea. Quæ si affuerint, prius vomere cogendus est, deinde de pilulis cochij dosim vnā sumat, & à frigidis absteineat cibis. Si autem neque animæ subuersio, neque nausea affuerint, neque caliditatis signa apparuerint, venter ex pilulis cochij multoties soluatur. Cibaria quoque frigida omnino vitet, & gargarismus fiat quo phlegma deponatur. In naribus quoque post illud ponatur aliquid de his quæ nominauimus, quò caput calefiat.

## De Phrenesi.

## Cap. III.

**Q**Vando aliquem febris cōclusa cōtinua inuasit cum forti capitis & oculorum grauedine, & in facie atque oculis vehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & horror luminis affuerint, & in pulsu velocitas, & frequentia superfluitas inueniuntur, signa phrenesis certissima iudicabuntur. Quod si lingua nigra aut citrina fiat & permisceatur intellectus, & multum fuerit alienatus, & vigilauerit multum, iam phrenesis perfecta erit. Ægro igitur, antequam prædicta compleantur accidētia, est subueniendum ex sanguinis detractōne & ventris solutione cum succo fructuum. Nutrimētum verò eius sit aqua hordei, semel aut bis in die sumpta, secundum consuetudinem quam in tempore sanitatis habuit. Caput autem oxirodino infundendum erit. Quod si multæ affuerint vigilæ, sumatur violarum siccarum, corticum papaueris albi, hordei excorticati, seminis lactucarum, radicum mandragoræ, omnium aena manipulus vnus. Quæ omnia in cucuma plena aqua tandiu coquantur, donec aqua rubea fiat. Deinde aqua illa dum est tepida, ab alto super caput fundatur, & sit caput super cimini le in quo aqua colligatur, quæ in cucuma posita iterum super caput fundatur. Hoc autem omni die multoties fieri conuenit. Caput præterea ex oleo violato, muliebri lacti admixto inungendum erit, quod etiam in coto positum, capiti est superponēdum. Cum autem Æger in principio huius ægritudinis in virium fortitudine permanere inuentus fuerit, phlebotomari

duſ erit, niſi ſuper infirmum timueris. Poſtquā  
verò eius ægritudo minui cœperit, nequaquam  
phlebotomeſ. Quòd ſi eius iam diſſoluta eſt vir  
tus, ex alio præſerueſ regimine, donec euadat.

De Apoplexia.

Cap. III.

**C** Vm aliquis quaſi dormiens iacet, & ſine  
ſomno ſtertit, & cum pungitur, non ſen  
tit, tunc iam patitur apoplexiam. Eſt au  
tem huius ægritudinis quantitas, ſecūdum quòd  
fortiter aut debiliter ſtertit. Si tamen ſpuma ab  
ore exierit, non eſt ei medicandum. Cum autem  
parum ſtertit, ægritudo eſt leuior. Hęc quidem  
paſſio aut cito interficit, aut in paralyſim tran  
ſit. Cum ergo iſta viſa fuerint, attendendū erit,  
an patientis facies multum rubere, aut denigra  
ri aut viridis fieri videatur, quemadmodum con  
tingit cum ſanguis in aliquo membro ex coar  
tatione retinetur. Tunc enim ſanguis ilico ex  
duabus guidegi extrahendus eſt, aut ex duabus  
cephalicis. Quòd ſi ita non fuerit, imo cum aë  
rem attrahit, auditur in pectore oregmon, ex  
hoc clyſterio erit clyſterizandus. Quod, & colo  
quintidæ, bothormarien, centaureæ minoris, ar  
thanithæ, hellebori albi, omnium ana manipu  
lum vnum. Coquantur omnia in tribus libris a  
quæ donec ad vnā redeant. Deinde colentur,  
& ex media libra huius apozimatis fiat enema,  
quod ſi cito exierit, fiat iterum, donec humorū  
multitudo ſimul cum eo exeat. Naribus quoq;  
condiſi & helleborus albus ſuauiſſe inſuffletur.  
Et eſt ingeniandum, vt anacardinū cum hydro  
melle per os ad ſtomachum multotiens deſcen  
dere cogatur, quaq; die ſemel: ex quo vnus au

rei pondus in potu sumendum est. Cuius descriptio est in capitulo de paralyfi. Sartago præterea ferrea calefacienda est, & capiti multoties adeò vicinanda, vt patientis capilli adurantur. Quòd si hoc modo non sanatur, in medicando plus laborabimus. caput nanque rademus, & ex sinapi trito & castoreo & fortissimo aceto liniemus. In prima autem huius passionis specie, post phlebotomiã stringemus tortiter, adiutoria ligãdo superius parum sub cõiunctione ipsorum cū spatulis, & stringemus tibias similiter. Capiti quoq; superfundendum est oleum rosatum & acetū vini, & phlebotomia facienda est prius in pedibus, & postea in nasi extremitate.

De graui dormitatione. Cap. V.

**C**Um aliquis quasi dormiens iacet, & tamē sentit & mouetur, sed oculos secundum plurimum habet clausos quos tamen dū vocatur cum clamore, aperit, licet iterum statim claudat, iam patitur Subeth, qui cum clysteribus acutis, quæ paulo antè nominauimus, curandus est. In os quoq; ipsius mittemus hydromel, & laborabimus vt descēdat. Ipsum enī nutrimentum existit eius. Caput præterea vsq; ad diatricon primum oxiródino infundemus. Post tertium verò diem sternutationem prouocabim⁹ ex his quę nominauim⁹. & radem⁹ caput, & liniemus ex sinapi, & castoreo, & aceto.

De stupidis qui semper habent oculos apertos. Cap. VI.

**C**Um aliquis quasi dormiēs iacet, & nō mouetur, & licet oculi sint aperti, palpebras tamen non mouet, congelatus est siue ris



gidus. Curād<sup>9</sup> verò est ex medicinis subeth: hoc tamē addito, vt oleū sambucinū sup caput fū datur: & in omni libra eius sit vncia vna euphorbij. Ipsum quoq; caput ex castoreo & euphorbio & oleo sambucino liniatur.

## De Paralyfi. Cap. VII.

**C**Um aliquis se mouere nō valet, aut vnū vel plura ex mēbris mouere non potest, atq; eorū sensum amisit, ipsum paraly sim illius mēbri, aut mēbrorū incurrisse p nuntiamus. Cuius curā incipiemus pilulas foetidas quas ego cōposui dando, quæ & pulueris pigræ drachmas decē, coloquintidæ interioris drachmas quinq; euphorbij drachmas duas & semis, castorei, piperis, assæ foetidæ, serapini, opopana ci, seitaragi Indi, sinapis, omniū septē ana drachmā vnā, centaureæ minoris, elaterij, amborū ana drachmas quinq; , gūmæ in succo rutę dissoluatur, & alia ex eis cōficiātur, & fiant pilulę, & fiāt ex eis decē potiones. Quarū vnā postq̃ æger sumpserit, per tres dies quiescat, & nutriatur tūc cū aqua ciceris & oleo & sinapi, & de inde bibat aliā potionē. Quod postq̃ ter fecerit, per aliquot dies quiescat. Et nutriatur carne frustatim incisa & in sartagine frixa, & mutagenath, in quib<sup>9</sup> sint species calidæ, vt piper & his similia. In potu verò sumat hydromel. Mēbra quoq; eius ex oleo costino inungātur. Quod & costī vnciā vnā, piperis, piretri, euphorbij, ōniū triū ana tertiā vnciæ vni<sup>9</sup>, castorei vnciā semis, dissoluant omnia in media libra olei de cherua, aut de narcisco, & vttere eo. Diebus vero quib<sup>9</sup> quiescit, quaque die dandæ sunt duæ drachmæ

de anacardino, quod & zinziberis, piretri, nigellæ, costi, melanopiperis, macropiperis, oggij, omniū ana drachmas viginti, myrrhæ, rutæ siccæ, assæ foetidæ, aristologiæ, baccarum lauri, castorei, seitaragi indi, sinapis, gentianæ, omnium ana drachmas quicq, mellis anacardi drachmas quinq, vngatur ex oleo nucū, & cū melle cocto conficiatur. Hoc enim medicamē valde confert paralyfi, apoplexiæ, torturæ, & tremori, albaras, morfibz scorpionis, & omnib<sup>9</sup> passionibus frigidis, & spasmo humido. Cū autē sumitur, ilico prouocat sudorē, & infert febrē. Quòd si sumptū nō affert sanitatē, æger ab omni medicamine per decē dies abstineat, excepta dieta, deinde ad ipsius curā redeundū est. Quòd si paralyfis ex percussione, aut casu euenerit, & acciderit subito, taliter permanebit. Nunq̃ enim sanabitur. Q̃ si non repēte ex prædictis, sed paulatim & molliter inuaserit, loco pcussionis emplastrū hoc apponēdū erit, quod & farinā sceni græci, semen ben, semen mahalep, semen resin, bdelliū amoniacum, adipem anatis, ceram, oleū de lilio, ex his fiat emplastrū & superponatur.

De stupore & tremore. . . Cap. VIII.

**C**Um aliquis sentit aliquod suorū mēbro-  
rum sicut est dispositio pedis cū sit stupi-  
d<sup>9</sup>, dicim<sup>9</sup> in illo mēbro stuporē esse.  
Quapropter ei<sup>9</sup> cura non est differēda. Quādo  
enī plongatur tēpus hui<sup>9</sup> ægritudinis, perducit  
ad paralyfim. Curatur autē hæc passio ex ali-  
qua parte medicinarū paralyfis, & cū dieta &  
vnctiōe ex oleo costino. Quòd si inueterauerit  
passio, æger ex pilulis foetidis purgād<sup>9</sup> erit, & cō

plexio æquanda cum anacardino & dieta. Tremor autem ex eisdem curatur ex quibus sanatur stupor. Sed si ex superflui vini potu euenerit, æger ab ipso erit abstinendus. Similiter si aquam, quæ ex niue dissoluitur, bibendo hanc incurrerit passionem, ab ipsa abstineat, & balneum calidissimum ingrediatur, in quo tamdiu moram faciat, donec fudet, & in sole assidue moretur.

## De tortura oris.

## Cap. IX.

**C**VM hominis os cōtorquetur, & vnum de oculis suis claudere non valet, & si præcipitur ei vt sufflet, flatus ab vna tantum parte exire videtur, ipsum tunc contorsionem pati dicimus. Cuius curam incipiemus cum solutione ventris ex pilulis foetidis. Nutrimētum verò eius atq; ipsius potum ponimus, vt in capitulo de paralyfi diximus. Aegrum præterea quotidie in mane antequam comedat, sinapim cū syrupo acetofo gargarizare faciem⁹. Et mittemus eum in domum obscuram, & præcipientus vt vnam nucem muscatam in parte oris quæ torta est teneat. Naribus quoque insufflabimus condisi, vt sternutatio prouocetur. Spondylos quoque colli eius & faciem eius, & frontem ex oleo costino inungere cōuenit. Et est quotidie de anacardino vnus aurei pondus sumendum. Et si passio hoc modo soluta nō fuerit, ad ventris solutionē & ægri præseruationē redeundum est. De tortura verò quæ non repente sed paulatim accidit, non loquimur. Ipsa namq; nō contingit nisi in phrenesi perniciosa, morte iam imminente, & est ex siccitate.

## De Spasmo. Cap. X.

**C**Um aliquod membrum alicuius contrahitur, & ad suam redit originem, aut pleraque ex membris sic disponuntur, ipsa spasmata esse pronuntiamus. Spasmus autem subito aut paulatim inuadit. Sed spasmo subito euenienti, eadem præparanda est cura quam paralyssi conferre diximus. In eo tamē fricatione manuū & vnctione ex oleo costino plus utimur. Spasmus verò qui non repente sed suauiter accidit post febrem aut multam ventris solutionem, aut multum vomitum aut sanguinis fluxum, malus est & vix curabilis. Quicquid tamen accadat, ei mederi incipiemus. Aegro namque hordei aquam & iura vnctuosa & mollia administrabimus, & in aquam dulcem tepidam ipsum mittemus, & vngemus ex oleo violato tepido, & oleo de seminibus cucurbitæ, & præcipuè neruorum radices in quibus spasmus existit. In tina quoque diu moretur, & ex oleo violato inungatur. De viño bibat patiens parū, quod tamen multum habeat aquæ admixtum, & cibis nutriatur humidis.

## De Epilepsia. Cap. XI.

**C**Um aliquis cadit in terram & torquetur & commouetur, & intellectū amittit, dicimus ipsum epilepticū esse. Quod si spuma exit per os, aut se cōmingit, aut sperma egreditur, aut egestio, passio tunc est prauis or & vehementior. Si autem Aeger antecessionem sentit, quasi aliquid ex aliquo suorum membrorum eleuari, & ascendendo caput petere, & deinde syncopizatur & cadit, tunc oportet in

hora qua sentit illud, anteq̃ istud accadat, membrũ a quo procedit quod prædixim⁹, fortiter ligare. prohibebit namq; hoc accessionem venire. In tẽpore verò quietis, corp⁹ multoties erit euacuandũ cũ pilulis cochijs. Et locus a quo exoritur passio, ex sinapi & pipere & euphorbio, ac melle anacardi erit epithimãdus, vbi epithima dimittendũ erit, donec locus vesicetur, & vesicę rumpatur, & aqua quæ in eis collecta est, effluat. Ipsæ quoq; non cito sunt consolidandæ, quin imo dimittendæ, vt quod in eis colligitur, emanet: deinde consolidentur. Hoc enim omnino huius ægritudinis certa salus existit. Ad vltimum etiã ventosas cũ pauca scarificatione superponere vtile est. Aeger verò si ante accessionẽ nau seam aut tristitiã aut cordis tremorẽ sentit, & deinde ægritudinis accessio sequitur, cogendus est multoties vomere ex aliquo vomitiuo, deinde pigram in potu sæpe accipere conuenit. Stomacho quoq; emplastrum ex spica, & rosis, & mastice, & cortice thuris, cũ vino odorifero imponendũ est. Nutrimentum præterea eius totum taliter statuendum est, vt paucarum sit superfluitatum, sicut caro frixa in sartagine, & caro cocta in cazolis, & cibus qui sit de aue quadam quæ habet in palato dentes & vocatur taguid, & caro de volatilibus & hoedina. Quod si cum epilepsia sensuum affuerit tenebrositas & debilitas, neq; aliqua de prædictis significationibus inueniatur, ægro pilulæ cochix multoties sunt tribuendæ, & eius cõseruatio subtilianda, & cibaria, quæ diximus, danda. Gargarism⁹ quoq; fieri debet, & sternutatio ex his quæ di-

ximus puocāda, ac narib<sup>9</sup> peoniæ pulvis subtilissimus qui simileſ alcohol, inſufflādus. Si quis autē cū epilepsia in facie & oculis rubedinē habuerit, & venarū groſſitiē, phlebotomādus erit ex vena saphena. Sanguis etiā ex carnositate tibiarum cū ventosis erit extrahēdus. Capiti præterea oleū roſarū & acetum superfundātur. Et abſtineat à vino & à cepis, & allijs ac ſinapī, & porris, & apio, & fabis, & cannabi, & poſtremo ab omnibus fumum caput aſcendentem & reſplentem generantibus. Electuarium quod omni epilepsia ſpeciei remediū affert, & pīretri, liſeolos, ſticados, omnium ana drachmas decē, agarici drachmas quinque, cordumeni recentis & aſcuti, aſſæ foetidæ optimæ, ariſtologiae rotundæ, omnium ana drachmam vnā ſemis. Deinde extrahatur ſuccus ex ſquilla, & mixtus cū pari quātitate mellis coquatur, & conficiātur ex eo ſpecies, & fiat electuarium, ex quo patiens quotidie ſumat, & caueat ſibi à groſſis cibis. Electuariū hoc omnib<sup>9</sup> epilepsia ſpecieb<sup>9</sup>, excepta vna ſanguinea, quā Galenus nominauit, & nos etiam eius fecimus mentionem, opitulatur: cui vidi conferre phlebotomiam ex ſaphena prius, & poſtea ex baſilica. Deinde ei<sup>9</sup> rēgimen ſit ex his quę ſanguinē in corpore minuunt & ipſum inſfrigidant. A carne præterea & vino abſtineat, & bibat rob acetosorū fructuum, capiti quoq; ſuperponantur ea quę ipſum inſfrigidant.

## De Incuborū collatione. Cap. XII.

**C**um quis in ſomno quaſi rē grauē ali quid ſuper ſe cadere ſenſerit, incubum pati denuntiandus eſt. In ipſius itaque

cura non est tardandū, ipse enim epilepsiæ præambulus est, ipsam namq; præcedit. Aeger ergo si in colore rubeus fuerit, & venas habuerit plenas, ex saphena erit minuendus, & ventosæ in carnositate tibiarum ponendæ sunt. Aeger præterea à potu vini & rerum dulcium comestione abstrahendus erit, & præcipuè ab omni re quæ multum generat sanguinem. Quòd si huic contrarium acciderit, venter ex pilulis cochijs multoties erit soluendus & eius regimen subtiliandum. Exercitio quoque vtendū erit, & mēbra inferiora erunt fricanda.

## De Melancholia. Cap. XIII.

**C**Um alicui cogitationes malæ sine causa manifesta acciderint, & timor & tristitia in eo præualuerint, melancholiæ principium in eo est. Cum autem res ad hoc deuenit, vt etiam ea quæ cogitare cœpit. ore promat, verbâq; sua atq; actus permisceat, iam melancholia perfecta est. Cui ergo hæ malæ cogitationes & tristitia & tribulatio accidūt, anteq̃ præualere incipiāt, succurrendū est. Quia si præualuerint, cura erit difficilis. Quòd si cum melancholia fuerit dolor ventris & inflatio, & malus color, & digestionis corruptio, & vomitus acetosus, & excreationū multitudo, incipienda est cura cū phlebotomia ex basilica, aut saluatella sinistræ manus. Et si sanguis visus fuerit niger, dimittat egredi in q̃titate multa. Subtilis autē & rube⁹ si fuerit, ilico restringēdus erit. Aeger verò ex rebus lenientib⁹ est nutriēdus, vt sunt aleffidebegi, quæ fiunt ex carne hoedina & arietina, & mittēd⁹ est in balneū, in quo nō diu mo

retur. Post hæc autem decoctione de epithimo quam ego cōposui, vtatur. Hæc est decoctio de epithimo: & mirobalanorum indorū drachmas decem, polipodij drachmas quinq;, sene drachmas nouē, turbith drachmas quatuor, sticados drachmas decem, passularum enucleatarū drachmas decem, epithimi Cretenfis drachmas decem. Omnia excepto epithimo in tribus libris aquæ coquenda sunt donec ad vnam libram & mediam redeant. Cūque hoc factum fuerit, addatur epithimum, & illico ab igne remoueantur & dimittantur donec infrigidari cœperint. Cūque infrigidata fuerint, manibus fricata colentur. Deinde sumantur agarici duæ tertiæ drachmæ vnius, aloes drachma vna, salis indi drachma semis, hellebori nigri quarta vnius drachmæ: conficiantur cum melle, aut cum iuleb, & fiant ex eis pilulæ quæ per tres horas ante decoctionis acceptionem sumendæ erūt. Posteaumat decoctionē, deinde tribus diebus quiescat. In his autem diebus quibus quiescit, nutriatur ex his quæ prædiximus, & in potu summat vinum subtile & clarū & bene odoriferū. Post hæc quoq; iterū soluendus est vt prius, hoc verò ita vt prædiximus tertio iterandū est, quarta quoq; potio ei danda est. Aeger verò ab omnibus quæ cholerā generant nigram, abstrahendus est, vt sunt carnes syluestres omnes, & caro vaccina & porcina, & magnarū caprarū, & fabæ, & caro salita, & caseus vetus, & propriè lætes, & omnia olera nisi humefaciētia. Vitet præterea vinū grossum, & laborē & vigilias, neque patiatur famem neq; sitim, vino vero subtili in



potu vtatur, & præcipiendū est ei vt dormiat, & studendū in splenis curatione, ex his quæ in sequētib<sup>9</sup> in capitulo de splenis curatione qui augmentat, dicturi sumus. Os quoq; stomachi confortandū est, & ppriè ex medicinis, quarū mentionē in sequētib<sup>9</sup> facturi sumus cū egritudines stomachi nominabim<sup>9</sup>. Si autē cū melancholia ea quæ nominauim<sup>9</sup> nō fuerint, accideritq; post phrenesim aut lōgā morā sub sole, aut pçussionē ī capite, ī pricipio ex cephalica phlebotomia est faciēda, & capiti studiū adhibēdū ex reliquo regimine quod diximus propriè. Aqua præterea tepida ab alto loco super caput fundēda est, deinde oleū rosatum cū aceto vini capiti infundatur, & lac muliebre desuper mulgeatur. Nasibus etiam oleum de seminib<sup>9</sup> cucurbitæ dulcis & lac muliebre iniiciantur. In balneū quoq; sæpe mittēdus est, & multū ex aqua tepida capiti est superfundendū. Aeger etiā omnia odorifera quæ frigida sunt odoret. Si autē cū melancholia nihil fuerit eorū quæ diximus, in principio matrix vena dextri brachij aperiēda erit, & sanguis cōsiderandus, & vt prædixim<sup>9</sup> faciēdū, & regendū vt dixim<sup>9</sup>. Et postq̃ hoc regimē infirmo adhibueris, p aliquot dies quiescere dimittendus est, deinde vt prius in cura eius incipiendum, donec sanitatis fiat restitutio. Studiū verò totū quod erga melancholicos est, obseruandū est, vt impinguētur & carnosi fiāt. Ex quo enim pingues & carnosi fuerint, ilico sani erunt. Cibi autē qui illis cōgruūt sunt caro arietina, & hœdina, & gallinacea, & panis de simyla. Opīrus autē panis nullo modo est eis cōgruus. Vinum

quoq; subtile & clarū eis cōueniēs est. Vinū verò grossum nō est eis bonū, neq; nigrū. Lac autem recēter ab vberib<sup>9</sup> extractū dum adhuc cālēt, eis cōfert, & pisces recētes, & sisami de zucaro facti, & oleo amygdalino. Prēterea audire cātilenas & gaudere & habere ante se res deliciosas & dormire plurimū, cōfert eis. Econtrario verò cogitare & solus morari, & vigilare maximē nocet eis. Pilulæ quæ cholera nigrā expellūt, ex quib<sup>9</sup> datur his qui decoctionē sumere nequeūt, & .epithimi Crētēsis drachmas viginti, polipodij, agarici, amborū ana drachmas decem, hellebori nigri, salis indi, amborū ana drachmas quinq;, sticados drachmas septē, pulueris hieræ pigræ drachmas quindecim, bibat ex eis drachmas tres. In diebus verò quibus quiescit, æger debet sumere ex electuario quod vocatur laticifcās, qđ & .melissę, corticū citri, garyophyllorū, gallię muscatę, masticis, croci oriētalīs, cinamomi, nucis muscatæ, cardamomi, neheremisch, been albi & rubei, zedoariæ, daronici, seminis ozimi maioris, seminis ozimi garyophyllati, ōniū ana partes æquales, musci q̄tū est decia pars drachmę vni<sup>9</sup>. Deinde fumant chebuli. xx. & ēblici. xxx. & terātur, & in trib<sup>9</sup> libris aquæ coquant donec ad vnā redeāt, & colētur. In colatura verò mittat mellis lib. i. Deinde bulliāt donec aqua cōsūpta sit. Pōst ex hoc melle cōficiātur prēdictę species, quod tamen in pōdere sit triplū ad species, de quo, cū necesse fuerit, ad magnitudinē auellanę fumendū est. Hoc enim medicamē lētitiā & coloris pulchritudinē & digestionis bonitatē operatur, & retardat canos.

## De Catarrho.

## Cap. XIII.

**C**Um caput alicuius in egressione balnei discoopertū fuerit, aut post exercitium aut post aliud, fueritq; aër frigidus, & ventus septētrionalis, & acciderit inde naribus & palato pruritus & commotio, & sternutatio: Pannus tūc calefaciendus erit, & capiti superponendus. in quo tandiū moretur donec æger calorem in capitis profunditatē penetrasse sentiat. Deinde nigellā odorare incipiat, & prouocetur sternutatio, & caueat ne supinus iaceat, & comedat parum. A vino quoq; omnino abstinēat. Quod si passio ex appositione panni calidi alleuiata non fuerit, neq; minuitur per ipsum, fiat phlebotomia ex cephalica, & soluatur natura ex rebus quæ non exasperant, sicut hæc decoctio, quā in potu sumere debet qui tussim patitur, & in pectore asperitatē habet, & indiget ventris solutione, quæ & iuiubas viginti, sebestē triginta, passularū enucleatarū decē drachmas, violarū siccarū drachmas quatuor, radicis liquiritiæ fractæ drachmas quinq;, ficus citrinas decem, coquātur in trib<sup>9</sup> libris aquæ, donec redeāt ad vnam, & colentur, & in colatura dissoluantur, cassiæ fistulæ drachmas septem, tereniabin drachmas decē. Quod si neq; phlebotomia profuerit, neq; ventris solutio, & materia ad pect<sup>9</sup> descēderit, & cōmoueātur tussis & febris, ilico fiat phlebotomia, & patiēs à carne abstineat & vino, & in potuumat aquā hordei, & muraba violatū q̄diu calor fixus perseuerauerit, & tussis fuerit sicca & aspera. Sed postq̄ calor quieuerit, & tussis mollificata fuerit, & screate incœperit,

hæc decoctio quaq; die cū muraba violato dāda erit donec pectus mundificetur, & tussis sedetur, & vox clara reddatur, quæ ꝛ. ficus citrinus quinq;, iuiubas decem, sebesten viginti, passularum albarū & enucleatarū drachmas decē, liquiriciæ excorticatæ drachmas quinq;. coquantur vsq; ad dissolutionē & colentur, & dentur ex hoc omni die vnciæ tres in potū cū muraba violato drachmis quinq;. Si vero tussis inueterauerit ac diu permanferit, tunc ostendemus qualiter curanda sit, cū de tussis cura tractabimus. Quod si cursus in naribus diu perseuerauerit, & non fuerit calor, fluxus erit restringendus suffumigando nares per traiectorium. Et si quod per nares effluit, subtile & acutum ac citrinum fuerit, suffumigatio fiat ex sulphure infuso prius in aceto & postea siccato, aut ex fabis aut hordeo excorticatis, & in aceto prius infusis, & postea siccatis, aut ex zuccaro albo, & sandalo albo. Q; si neq; calor neq; rubedo in facie fuerint, suffumigatio fiat ex costo aut thure. Hæc nanq; suffumigatio fluxū restringit.

## De Ophthalmia,

## Cap. XV.

**C**Um ea quæ in oculis alba sunt in rubedinē mutata fuerint, fluxerintq; lachrymæ, & in angulis oculorū lachrymalib<sup>9</sup> lippitudo collecta fuerit, dicemus tunc ægrum pati ophthalmiā, & quanto plus symptomatū vehementia, aut ipsorū affuerit minoratio, tanta erit ophthalmiæ fortitudo aut eius debilitas. Deterior autē ophthalmia est cū alba oculorū videtur inflata, & adedē eleuata, vt oculorū cooperiant nigredinē & palpebræ inuersentur. In prin-

cipio verò curationis ophthalmiæ cephalica est  
 phlebotomāda ex manu vel brachio partis con-  
 trariæ in qua est ocul⁹ infirmus, nisi levis fuerit  
 ophthalmia. Et q̄to fortior fuerit ophthalmia,  
 tanto pl⁹ est minuendū ex sanguine. Deinde vē-  
 ter ex mirobalanis citrinis, & tereniabīn, & suc-  
 co fructuū solued⁹ est. Et æger à carne & vino,  
 & à reb⁹ dulcib⁹ abstinere debet, & cibū minue-  
 re. Qz si ista nō suffecerint, sief albū in lacte pu-  
 ellā lactātis fricandū, & in oculos distillādū. Et  
 si lippitudinis multitudo in oculo collecta fue-  
 rit, radius coto inuoluat, & madefiat in aqua, &  
 cū eo oculus ab illa lippa mūdet. Deinde puluis  
 albus aspergat, & supponēdo oculis aliquid sua-  
 uiter sustētetur, & liget, & æger in domū tene-  
 brosam mittat, & ingeniandū est q̄tū possibile  
 est vt somn⁹ puocet. Caueat tamē ne sup oculū  
 infirmū dormiat, & ne caput depressum sit, sed  
 super⁹ eleuatū, neq; vestimentorū capitia sint  
 stricta, neq; in faciē se diu pijciat. Si autē oculus  
 leuior fiat, & dolor sedetur, ac lachrymæ mi-  
 nuant, phlebotomia iā facta & vētre soluto bal-  
 neū multoties & frequēter ingrediatur. Ex hoc  
 enī passiōis reliquie dissoluent. Qz si ī oculo hu-  
 morositas & grauedo remāserit, puluis citrinus  
 erit immittēd⁹. Ex his autē quę habēti ophthal-  
 miā multū cōferūt, est, vt frons & palpebrę ex  
 hoc liniātur epithimate, quod & sief memithæ,  
 rosarū, aloes, licij, sandali rubei, faufel, croci ori-  
 entalis, omniū ana partes æquales. fiant ex his  
 pilulæ, cūmq; necesse fuerit resoluatur vna ex  
 eis in succo coriandri aut in succo endiuia: aut  
 cū aqua rosata, & liniatur cū eo, & sanabitur si

Deus voluerit. Sief albū, ꝛ. cerusæ ablutæ drachmas decē, sarcocollæ grossæ drachmas tres, dragagāti drachmā vnā, opij drachmæ semissē: fiant ex his formæ lenti similes. Puluis citrin⁹, ꝛ. sarcocollæ grossæ drachmas decē, aloes drachmas duas, croci drachmas duas, myrrhæ drachmā vnā, licij drachmas duas: ex eis optime tritis immittat puluis cū opus fuerit. Puluis alb⁹, ꝛ. sarcocollā albā & pingue, quæ mittat in lac mulieris, quod melius erit cū alicui⁹ iuuenulæ fuerit, & dimittat in vmbra donec siccet, & terat optime, & ōnib⁹ drachmis decē, ipsi⁹ addat de sief memithæ drachmæ duæ, quę iterū optime trita reponatur, & cū op⁹ fuerit, in oculum mittantur. De vlcereb⁹ oculorū. Cap. XVI.

**C** Vm i oculo fortis dolor, & pūctio nociua ac pulsus sentiūtur, & lachrymarū fluit multitudo, cū palpebræ eleuant & oculi aperiūtur: loca quę sunt in albis ipsorū inueniuntur rubea, aut si totū fuerit rubeū, & vn⁹ locus magis rubere inuenitur, aut in nigredine loc⁹ aliquis alb⁹ apparet, pustula iā in oculo exorta est. Ad hāc vero curādā passionē necessari⁹ est Medic⁹ in curis oculorū valde instruct⁹. Nos tamē curatiōis ipsi⁹ sūmas & aggregatiōes dicemus. Dicim⁹ itaq; qd vlcera quę in cōiūctiua nascūt, hoc est, in albis oculorū, nō adeo sūt timēda vt ea quę in cornea, hoc est, i oculi nigredine fiūt. Deteri⁹ vero vlcereū est illud quod in nigredine sub pupilla existit, eminētia nāq; ad istud est velocior. Horū autē vlcereū curā cū phlebotomia incipere debemus, & sanguinis extrahere multitudinē secūdū quod possibile fuerit. Cōsequēs

ter autē venter soluendus, & Aeger sibi cauere debet à carne & vino dulci, & esse cōtentus herbis frigidis, & in potu sola aqua vti. In oculo vero in initio sies albū cum lacte mulieris mittēdum, & si pulsus iam alleuiari & sedari videtur, sperandū est quòd ægritudo soluetur sine saniei collectione. Quòd si pulsatio post sanguinis extractionē & ventris solutionē, ac sies albi immiſsionē quiescere nō videtur, parua fiducia in hoc quod diximus est habenda. Est itaq; tūc sies de olibano mittendū in oculū, & pila aliqua oculo superponēda, & cū ligatura stringēda. Antè verò q̄ hoc eueniat, oculus suauiter est ligandus, & sine superpositione pilæ, & nō cesses in oculū de sies de thure sepe distillare donec sanies in pila videatur. Ex quo enim hoc visum fuerit, sies de plūbo vti necesse erit vsquequo p̄funditas fiat plana, & tota caro generetur. Et tamen quæ dixim⁹ tūc sunt faciēda, cū pustula nō est magna. Quoniā cū magna fuerit, fueritq; iuxta pupillā, aut infra eā, erit tūc necesse vt cū eleisir medicet ne oculus emineat. Ad pilæ quoq; suppositionē & ligaturā erit redeūdum. Aeger præterea semp supinus iacere debet, & à forti motu abstinere. Cū autē caro in loco vlcerū p̄fecte generata fuerit, vel loc⁹ apostematis carne replet⁹ fuerit, remanebit ibi ī oculo albedo. Q; si vlcus fuerit profundū, albedo erit grossa, & si in superficie tātū corneæ fuerit, erit subtilis. Vlc⁹ quoq; si à pupilla fuerit remotū, & steterit separatim p se vestigiū illud quod remanet, nihil mali faciet. Si autē iuxta pupillā fuerit quādoq; post vlceris curationē vestigiū remanens p̄hibebit vi-

sionē. Quapropter tūc est vtendū medicinis quibus vestigiū, quod dixim⁹, abstergi & deleri possit. Sief de thure, & armoniaci, sarcocollæ amborū ana drachmas quinque, thuris drachmas decē, croci drachmas duas: conficiantur ex muscillagine fœnugræci, & fiant ex eis sief. Sief de plūbo, & plumbi adusti, antimonij, thuciæ ablutæ, calcecumenon, gūmi arabici, dragagāti, omniū ana drachmas septem, opij drachmæ semissem: terantur, & cum panno serico qui sit subtilissimus, cribellentur, & conspergantur ex aqua pluuiali, & fiant ex eis sief. Sief ex quo caro in vlceribus oculorum generatur, & vueæ egressio prohibetur, & vestigium subtiliatur, & climiæ ablutæ, thuciæ ablutæ, cerusæ, antimonij, thuris, omnium ana drachmas duas, myrrhæ drachmam vnam, sarcocollæ grossæ drachmā vnā & semis, sanguinis draconis, aloes, opij, omnium ana drachmam vnā, fiat ex eis sief. Eleisir quo est vtendum cum timetur ne ex vlcere vueæ sequatur egressio, & antimonij, ematitis, amborū ana drachmas decē, acaciæ drachmas tres, aloes drachmam vnam: terātur, & fiant ex eis sief, & administrentur apud necessitatem.

De his quæ in oculos cadunt, siue sit pilus siue palea siue aliud. Cap. XVII.

**S**vmatur resina, id est, gumma pini, & per oculum trahatur, & extrahit illud quod in oculum cecidit.

De albedine quæ fit in oculo. Cap. XVIII.

**A**lbedo quæ in oculis contingit, est vestigium post vlcerum curationē remanens quando consolidantur. Quæ cum in ocu



lis puerorum fit, leuior est ad curandum, quàm cum in senibus. Cum enim fit in senibus fortasse ad sanandum impossibilis est nisi subtilissima fuerit. Hæc autem passio ex his medicaminibus curanda est. Postquàm æger balneum egressus fuerit, aut faciem super vaporem aquæ calidæ vsquequo rubea sit tenuerit. Si tamen ex hoc medicamine in venis oculi rubedo & dolor prouenerint, per aliquot dies ab eo quiescendum est donec oculus quiescat, & post ad id redeundum. Medicamen valde vtile ad albedinem remouendā & cito eradicandam. Ego quoque non vidi quod eo melius aut æquale esset ad albedinem delendam, & massacumię, spumę maris, stercoris magni lacerti, baurach, zuccari higeri, omnium ana partes æquales. Deinde sumantur acori, coelidonię, amborum ana drachmæ decem, coquantur in libra vna aquæ donec ad quartam redeant & colentur, & ex hac aqua imbibantur species quas prædiximus, ita quodd conficiantur ex ea & siccentur in vmbra, deinde iterum terantur & conspergātur vt prius, & siccentur, quod postquam quater factum fuerit, siccentur & terantur, & in oculo mittantur. Hoc enim medicamen nulli, vt prædiximus, compar existit in remotione albedinis. Remouet enim hoc medicamen grossam albedinem etiā ex oculis animalium.

De Scabie & Sebel.

Cap. XIX.

**C**Um palpebra inuersatur & interius apparet rubea & aspera, scabies adest. Et cum super alba oculorū ac super nigredinē videtur similitudo pāniculi ex venis rube-

is & grossis texti, adest passio quæ vocatur sebel. Hæ vero duę passiones graues sunt & chronicæ, & vix curabiles. Patiens tamē dum sanus est, phlebotomia ex brachio & fronte & ventris solutione vti debet, & in comestione vitare dactilos, & sisamos de melle, & vitet ebrietatē. Et quando non est plenus, sæpe ingredi balneū est ei vtile, & frequenter immittere oculo sief rubeum similiter confert. Sief rubeum, & emathtis, colcotar combusti, amborum ana drachmas tres, æris vsti drachmas duas, myrrhæ, croci, amborum ana drachmā vnam, piperis longi drachmæ semissem, conspergantur ex vino veteri, & fiat ex eis sief. His præterea ægritudinibus viride confert sief, cuius descriptio in capitulo de vngula continetur. Quod si passiones istæ vetustæ fiant, scabies fricatione indigebit, & sebel collectione. Non tamen mensuræ huius libri congruit, vt de his tractemus.

De lachrymalibus cū pruriunt. Cap. XX.

**E**Ndiuia tenera sumatur & conteratur & fiāt ex ea magdaliones parui, & ex oleo violato inungantur, & oculis superponantur, & in hora dormiendī ligentur, rosatum tamen melius est, & citius confert. Et si hoc non suffecerit, lentes absq; corticibus, & sumach, & rosæ rubæ, & granati carnositas sumantur, cōtrita ex careno cōspergātur, & more emplastri superponantur. Quod si nō suffecerit, ex cephalica prius phlebotometur patiēs. Deinde ex vena frōtis, & ex venis quę sunt in angulis lachrymalibus. Venter quoq; frequenter soluat, & balneum multoties ingrediatur.

## De Vngula.

## Cap. XXI.

**C**Um aliquid pāniculo simile, ex angulo, qui est ex parte naris, oriri videtur, & album oculi cooperire, & peruenit vsque ad nigredinem, generatur passio quæ vngula dicitur. Cuius nocumentum, tūc solum est peius, cum peruenit ad nigredinis partē quæ est iuxta pupillam. Hæc igitur passio dum subtilis est cum sief viridi, & sief de chalcātho est medicāda. Si autem vetusta fiat & grossa, cū ferro est euellenda. Sief viride quod confert sebel, & scabiei, & vngulæ, & albugini, & ziniar drachmas tres, colcotar vsti drachmas sex, arsenici rubei, baurach, spumæ maris, omnium ana drachmā vnā, salis armoniaci drachmę semissē, amoniaci drachmas duas. Armoniacum in succo rutæ dissoluatur, & species ex eo conspergantur & fiāt ex eis sief, est enim mirabile. Sief de chalcantho quod confert vngulæ, & æris vsti, chalcanthi amborū ana drachmas quinque, ziniar drachmas duas, salis armoniaci, baurach, arsenici sublimati omnium ana drachmam vnā: terantur, & per hebdomadam vnā dimittātur, deinde fiant ex eis sief, & fricetur vngula cum eis.

De macula rubea ex percussione vel alia re.

## Cap. XXII.

**C**Um in oculo ex pcussione aut ex re alia punctum rubeum fieri cōtingit, sanguis qui ibi est dissoluēdus est, postquam æstuatō quieuerit. Sumantur igitur arsenici rubei, olibani, myrrhæ, armoniaci, omnium ana partes æquales, & fiant ex eis sief. Qui in succo coriandri fricētur & in oculū distillantur. Quā

diu tamen dolor perseverat, albumen oui sumendum est & oleo rosato miscendum, & cotum ex eis inuolutum, oculo est superponendum.

De Lachrymis. Cap. XXIII.

**C**um lachrymales oculorum anguli semper humidi videntur, patiens quotidie ieiunus balneum ingrediatur, & in oculum alcohol istud mittatur. Istud autem alcohol, & thuciæ drachmas decem, coralli rubei, mirobalani, citrini fricati, aloes, omniū ana drachmas duas, piperis drachmę semissem fiat ex his pulvis qui assidue immittatur oculo.

De debilitate visus. Cap. XXIII.

**S**i cum debilitate visus humiditatis signa apparuerint manifesta, quę in tempore famis & exercitij parumper dissolui videantur, Pilulæ cochicę multotiens erunt infirmo tribuendę. Nutrimentum quoque patientis desiccantium esse debet, & Æger sæpe vomere cogendus est. Pulveres etiam desiccativi oculis sunt immittendi. Quod si cum prædicta ægritudine affuerint siccitas & corporis macies, nutrimentum erit augmentandum, & vinum in potu tribuendum, ac super caput ipsius aqua tepida fundenda, & incuruatio super eam facienda. Balneum præterea ingrediatur, in quo tamen nō multum sudet. Naribus quoque oleum de amygdalis dulcibus atque auribus est immittendū. Oculis vero lac mulieris adolescentis quaque die est iniiciendum. Quod etiam frequenter fieri convenit. Hęc quoque debilitatis visus species fortior fit in tempore famis, & dum venter vacuus fuerit. Confectio alcohol quod valde acuit vi-

sum, qui causa humoris debilitatur, & thuciae ablutæ & siccatae drachmas viginti, deinde extrahatur succus sanfuci viridis, & per noctem vnâ residere dimittatur, & coletur, ex quo thucia cōspersa dimittatur quousque siccetur, postea teratur. Deinde fumantur zinziberis, piperis nigri, macropiperis, cœlidoniæ, omniū ana drachmæ duę, salis armoniaci drachma vna cū thucię drachmis viginti, hæc oīa terātur, & ex succo teneri foeniculi cōspergant, & siccata iterū terātur, & reponant. Et cū necesse fuerit oculis imitant. Ad hoc p̄terea valde cōfert sief de fellibus.

De tumore palpebrarum. Cap. XXV.

**E**Pithimetur ex epithimate, quod in capitulo de Ophthalmia nominauimus.

De conuersis pilis qui nascuntur in palpebris magis interius quā debent, & pūgunt oculum. Cap. XXVI.

**S**I pilus fuerit vnus aut duo, alijs palpebrarum pilis cum mastice aut oleo Seni sunt annectendi, aut radicitus euellantur, & loca a quib⁹ euulsi sunt cum ferro acuto aut acudurantur. Si autem multi fuerint, necesse est vt caro palpebræ incidatur. Loqui tamen de hoc nostri libri mensuram prætergreditur.

De cataracta siue aqua descendente in oculum. Cap. XXVII.

**Q**Vandoq; alicui videtur q̄ ante se habeat cimices, aut alia parua corpora subtilia & radiofa. Quod aliquando causa stomachi, aliquando ex proprio nocumēto ipsius oculi contingit. Ideoque differentia inter hæc duo cōsiderāda est, neq; p̄ paruo est habēdū cū

hoc accidēs euenerit. Ex eo nanq; qđ causa ſto-  
 machi accidit, nō eſt multū timēdum qđ oculo  
 nocumētum inferat. Ex eo vero qđ ex proprio  
 vitio oculi cōtingit, valde timēdū eſt, hoc enim  
 aque principiū exiſtit. Hęc autē paſſio dū recēs  
 eſt & in principio, cū medicinis curabilis eſt, ſed  
 cū iam ad pfectionē deuenerit, ſanari nō poteſt,  
 niſi cū inciſiōe, & fortasse etiā inciſio pdeſſe nō  
 poterit. Quapropter differētia inter hęc duo p-  
 dicta diligēter eſt inueſtigāda, quæ eſt prout di-  
 cemus. Quādo imaginationes quę vidētur, vtriq;  
 apparēt oculo, exiſtimādū eſt cōtingere hoc ex  
 vitio ſtomachi, & ecōuerſo. Et cū imaginatiōes  
 in hora ſaſtidij & in hora malę digeſtionis plu-  
 res ſolito vident, in hora autē famis & laboris  
 pauciores apparēt, exiſtimandū eſt etiā hoc ex  
 ſtomacho eſſe. Et ſi ex quo iſtę imaginatiōes ac-  
 ciderūt, duo præterierūt mēſes aut plures, & in  
 pupilla nō fuerit viſa cōturbatio, exiſtimādū eſt  
 etiā hoc eſſe ex ſtomacho. Quādo autē iſtę exi-  
 ſtimationes tibi aggregatę fuerit, pilulas cochi-  
 as in potu tribue, & ſi paſſio oīno remouet, iam  
 exiſtimationes pdiētę certificatę erūt. Si aut vni  
 tantū oculo apparuerint, & vno modo in oībus  
 horis pmāferint, exiſtimandū eſt vitiū aque ad-  
 eſſe, præcipue cum in pupilla nō fuerit obfuſca-  
 tio. Obfuſcatio nanq; ſi fuerit in pupilla, dubita-  
 tio iam tunc erit ſublata. Cū autē paſſio hęc in  
 oculo propria fuerit, prohibendū eſt infirmo ne  
 cum ventosis minuat ſanguinem, neque ex bra-  
 chio, neque comedat piſces, nec omnia quæ hu-  
 meſtare poſſunt. Venter vero frequenter ſol-  
 uēdus eſt ex pilulis cochijs, & æger ex calefacti-

uis & desiccatiuis nutriēdus est,hydromel præterea in potu ei tribuendum,& in oculis sief de fellibus mittendum.Sief de fellibus quod proficit aquæ in principio & dilatationi pupillæ, & eis qui post occasum solis non vident, & tenebrositati visus quæ est ex humore,&.fellis gruis,fellis sabot,fellis hircini,fellis accipitris ,fellis aquilæ,fellis perdicis, omnium siccorum vnū aut plura, sumantur quoque pro omnibus drachmæ decem istorum siccorum, euphorbij,co-  
loquintidæ, serapini,omniū ana drachma vna, trita aggregentur,& conspergātur ex succo feniculi teneri,& mittantur in oculum.

De noctilopis, id est, qui post solis occasum non vident.

Cap. XXVIII.

**A**D hoc vtile existit epar caprinum scindere, & ponere super vnā sectionem piper longum,& cooperire ipsam ex alia sectione,pipere longo in medio existēte.Deinde ponere ipsum in furno,& dimittere ibi donec assetur, & desiccetur, & non comburatur. Quo facto, piper longum quod in medio erat, sumatur,& bene teratur cum pauco musco,deinde ex liquore qui ex epate assato expressus fuerit, conspergatur & siccetur & in oculum mittatur. Aut sel caprinum cum melle mixtum in cucuma super ignē coquatur, deinde radius eo illinit<sup>9</sup> immittatur oculo. Quod autem ad hoc magis valet,est vt sief de fellibus in oculū mittatur.Si autem hoc non suffecerit, venter soluatur,& sanguis ex duabus cephalicis & ex fronte minuatur,& regimen subtilietur.

De dilatatione pupillæ. Cap. XXIX.

**C**Um pupilla, hoc est, foramen quod est in nigredine oculi, adeo dilatari videtur, ut vndiq; pertingat ad albedinem, fueritq; post vehementem cephalæ dolorem, parua habenda est fiducia in eius cura. Sed si dilatatio parua fuerit, tunc assidua solutione ventris ex cochij: multoties & sief de fellibus in oculum mittendum. Quod si pupillam post percussione dilatari contingat, non est inde timendum, quia remouebitur. Fiat itaque emplastrum ex farina fabarum & camomilla, & euisco cum vino & aqua.

De fistulis quæ in angulis lachrymalibus fiunt. Cap. XXX.

**C**Um angulus lachrymalis resudat, & cum premitur, sanies & virus ab eo egredia-  
tur, fistulam pati intelligitur, quæ cum cauterio curatur. De hoc tamē loqui plus est quam huic nostro attinet libro. Nos tamen iam ei adiungimus medicamen, quod si adhibitum fuerit, ipsam per multos menses adeo tardare facit, ut æger sanus videatur. Medicamen autem illud, est. &, aloes, thuris, sarcocollæ, sanguinis draconis, balaustie, antimonij, aluminis, omniū ana partes æquales, ziniar, quantum est quarta pars vnius, fiant ex eis sief. Cumq; necesse fuerit, fistula in tantum prematur, ut quicquid saniei in ea continetur, egredia-  
tur. Deinde infirmus super lat<sup>9</sup> in quo nō est fistula iaceat, & de prædicto sief aliquid dissoluatur in aqua, de quo in angulo lachrymali tres guttæ aut quatuor imittantur, magno existēte interstitio inter pro-



fectionem vnius guttæ & alterius . Quo facto, Æger per tres sic iaceat horas. In mane quoque sequenti die, similiter fistula bene prematur, & fiat eadem cura. Quod per hebdomadam vnā fieri conuenit, & etiam tandiu donec nihil à fistula egrediatur, cum premitur. Ex hac nanque cura, locus multis mensibus siccus permanebit. De curis oculorum quantum huic loco necessarium esse putauim⁹, iam satis dictum esse credimus. Alia vero, quia sunt de curis quæ per ferrū exercētur, dimitramus, quia multis indigēt medicaminibus. Sunt tamen quædam ex eis quæ in locis in quibus de decoratione tractabimus, & sanitatis custodia, continentur.

De dolore qui fit in aure. Cap. XXXI.

**S**I cum dolore qui fit in aure, fuerit in facie inflammatio & pulsatio, sanguis ex cephalica erit minuendus, & oleum rosatū, aut oleum de floribus salicis tepidum cum paulo aceto est immittendum, lac quoque ita calidū vt ex mamilla egreditur multoties distillādum erit. Venter præterea ex mirobalanis citrinis & scamonea & aloë vehementer soluat, quod hoc modo fit, & . mirobalanorum citrinorum drachmas viginti, & puluerizatae in duabus libris aquæ coquantur donec ad duas vnius lib. tertias redeant, & colentur. Post hoc sumatur aloes drachma vna, scamoneæ sexta pars drachmæ vnius, aggregentur cum rob de citonijs, & fiant ex eis pilulæ, quæ per duas horas ante decoctionem sumantur, deinde bibatur decoctio. Quod si dolor non quieuerit, parum opij in oleo rosato resoluti in aurem mittatur. Et si pulsatio re-

dierit & tribus diebus perseuerauerit, oleum si-  
samini in quo anatis aut gallinæ adeps fuerit  
resolutus in aurem sæpe mittatur, ibi namq; est  
pustula quæ maturatione indiget. Cum autem  
dolor quieuerit, putredo iam tunc collecta erit,  
ideóq; pus subito ex insperato de aure egreditur.  
Cum autem dolor in aure sit post fastidiosam  
satietatem, aut post vêtos frigidos, oleû in quo  
ruta aut cepæ coctæ fuerint in aurem distillet.  
Et si hoc non suffecerit, oleû in quo turbith co-  
ctum fuerit distilletur, aut oleû de lilio sumat,  
& cuiq; vncie vni ex eo misceatur euphorbij re-  
cētis drachma vna, & castorei drachma vna. Sed  
si hoc iterû nō suffecerit, vëter ex pilulis cochij  
soluatur: paties quoq; balneû ingrediat, in quo  
etiā sudet: vinû quoq; vetus & forte ei tribuat.  
Si autē cum dolore auris fuerint sonitus & tin-  
nitus atq; ventositas, panicû siue miliû in sarta-  
gine torrefactû, calidû multoties superponatur.  
Auris quoq; super vaporem aque in qua sint co-  
cta menthastrû & sticados arabicus, & sansucus  
teneatur. De castoreo præterea & euphorbio in  
oleo sambucino dissolutis, quorû vnûquodq; q̃-  
tuor grana hordei ponderet, in aurē mittatur.

De vlcere quod fit in aure. Cap. XXXII.

**C**um pus ab aure egreditur, hydromel te-  
pidû multoties in vna die in aure est di-  
stillandum. Deinde hoc medicamē opti-  
me faciens ad hoc est immittendum, quod &  
sarcocollæ, aloes & sanguinis draconis, thuris,  
squamæ ferri ziniar, ana partes æquales, omnia  
in aceto dissoluantur & in aurem mittatur, aut  
liciniû melle illinitû in prædictis intingatur &

sic immittatur. Patiens itaq; ex hoc medicamine, & hydromelle medicetur donec sanus sit.

De sonitu & tinnitu aurium. Cap. XXXIII.

**F**ortasse quandoque contingit ex subtilitate sensus auditus, & eius claritate. Cuius signum est quod in tempore famis augetur, & in hora ebrietatis & satietatis minuitur. Quæ propria non indiget cura nisi superfluitatem obtineat. Tunc enim de opio dissoluto in oleo immittendum est in aurem quantum duo hordei grana ponderant. Si autem hæc cum grauedine capitis & auditus debilitate affuerint, oleum de semine raphani, & oleum de amygdalis amaris, & oleum rosatum in quo castoreum fuerit resolutum, sunt immittenda. Auris quoque superponenda est vapor aquæ, in qua sansucus sticados arabicus absynthium, methastrum & origanum cocta sint. Et venter multoties ex pilulis cochijs est soluendus, & cibaria minuenda, & vinum dimittendum.

De grauedine auditus. Cap. XXXIII.

**C**um in auditu contingit grauitas, considerandum est an sit ibi sordities quæ vocatur cera quæ sit in aure. Quæ si inuenerauerit, mundetur, aut cum medicinis secundum quod diximus, aut cum cura manus. Si autem sordes non affuerint, & euenerit hoc post satietatem fastidiosam, quæ eam præcessit, aut ægritudinem acutam, auris ponenda est super vaporem aquæ, in qua ea quæ prædiximus cocta fuerint, traiectorio interposito usque quo vapor ascendat. Quod hoc modo fieri cōuenit. Res istæ in cucuma habente os acutum coquantur. De

inde traiectorium ori cucumæ superponatur, & ne vapor egredi possit, pānis obuoluatur, & auris super os traiectorij ponatur. Istud præterea sief in aurem mittatur. Quod, & coloquintidæ drachmam vnā, baurach tertiam drachmæ vnus, castorei, aristologiæ rotūdæ, succi absynthij, omnium ana drachmæ semissem, costi quartam drachmæ vnus, euphorbij sextā drachmæ vnus, fellis vaccini quantum sufficit ad prædicta conficiēda, fiant ex eis sief. Cunque necesse fuerit vnum in oleo de amygdalis amaris resolutum auri immittatur. Hoc enim valde vtilē existit dolori phlegmatico & ventositati ac sonitui & tinnitui, qui ex grosso vento fuerit, & surditati quæ est ex grossis humoribus. Si autē debilitas auditus cōtingit post ieiunium aut vigilias, fueritque facies extenuata, & oculi concavi, æger balneum sæpe ingrediatur, & largiori cibo ac potu vtatur, & in somno fiat profundior, super caput quoque aquam tepidam cum oleo fundat donec sanetur. Quod si post phrenesim contingat, ex medicinis primis curetur.

De vermibus aurium & paruis ani-

malibus ipsas ingredientibus.

### Caput XXXV.

**C**Um in aure fuerit titillatio, & pruritus & dolor, deinde ceciderint vermes ab aure, immittatur auri succus méthastri, aut de folijs persicorum, aut oleum de nucleis ipso- rum, aut aloe in aqua dissoluatur & immittatur. Hæc enim vermes auris & parua animalia ingredientia ipsam, aut quæ in vlceribus nascuntur, interficiunt.

13. De eo quod in aure figitur ab exterioribus  
ingressum. Cap. XXXVI.

**C**um aliquid figitur in aure, oleum tepidum est immittendum, & patiens balneum ingrediatur, ibi morā faciens donec corpus eius mollificetur. Deinde naribus insuffletur cōdisi, & teneatur anhelitus donec sternutatio sequatur, forsitan enim sic egredietur. Si autem fuerit difficile & non exierit, erit necesse ut cū ferro auri immisso extrahatur. Quod etiā in naribus est faciendum, si quid eas ingressum fuerit, quod extrahi nō possit. Quod si aqua aurem intrauerit, capite ad partem auris illius inclinato saliat æger, & si non exierit, prouocetur sternutatio ut diximus. Deinde oleum tepidum multoties immittatur. Neq; hoc pro paruo est habendū, & præcipue si res malam habens qualitatem ingressa fuerit, ex ea nanq; grauis sequetur dolor.

De sanguine ex narib<sup>9</sup> fluēte. Cap. XXXVII.

**E**x his quæ sanguinis de naribus fluxū retinent, est succus albedarogi cum camphora fuerit in eo dissoluta, naribus immissus, confert enim ei qui hanc passionem incurrere solitus est, ante eam iniectus, aut in hora egritudinis. Aut sumātur gypsum, cinis chartæ de panno, gallæ, sanguis draconis, calx, zegi, & puluerizata naribus insufflentur. Aut liciniū in eis intinctum mittatur in nares, aut alumen iameni puluerizatum, ut alcohol cū amylo eiusdem quātitatis naribus insuffletur. Quod si adhuc vehementer manauerit, superiores brachiorum partes apud assellas cum instita, & coxæ

apud inguina ligetur, & testiculi similiter sunt ligandi. Si verò passio inualuerit, phlebotometur cephalica eiusdē partis de qua fluit sanguis. Si autem nec hoc modo strictus fuerit, magnæ ventosæ cum igne superponantur ventri ab ea parte de qua fluit sanguis. Medicamen quod vehementer valet ad sanguinem constringendum. Sumatur calx alba & levis, qua vtuntur aurifices & sæpe narib<sup>9</sup> insuffletur sine interpolatio-  
ne, & licinium albumine oui illinitum ea inuoluatur & naribus immittatur.

De escharis & vlceribus narium.

### Caput XXXVIII.

**C**VM in naribus fuerint escharæ, cera & oleum ac adeps gallinaceus eis immittantur, & aquam calidam naribus in mane multoties per aliquot dies odoret. Cūmq; pustulæ egredi cœperint, licinium aceto forti ifusum in quo sal positum sit, naribus immittatur, ac super eas similiter sal & acetum ponantur. Siccabuntur enim ex hoc & non prolongabitur earum mora. Quòd si vlcera ibi affuerint, vnguento de cerusa curentur.

De polypo vel hæmorrhoidibus quæ nascuntur in naribus.

### Cap. XXXIX.

**C**VM intus in narib<sup>9</sup> caro superflua molli & quasi dissoluta rubea, aut alba exorta fuerit, & nares ingrossari cœperint, ac ex carne prædicta repleri, cephalica prius erit phlebotomanda, deinde licinium ex vnguento viridi quod in capitulo de corrodentibus carnē nominauimus, liniendum & naribus erit immittendum. Si vero istud non suffecerit, medicamē

acutum quod ibi descripsimus apponatur donec ex toto mundificetur. Hæc præterea passio quandoque cum ferro curatur radicitus omnino incidendo. Medici tamen quandoque in hoc errant. vnde ex eorum cura eger maximum incurrit nocumentum, in hoc nanque loco cancer plerunque exoritur. Verum cancer quando in hoc nascitur loco, nec acutas tolerat medicinas, neque incisionem quæ fit cum ferro, imò indiget vt suauiter tractetur, & medicaminibus lenientibus, & phlebotomia, & ventris solutione curetur. Cognoscitur autem an illud accidens sit cancer, quia est durus pertingens quandoque vsque ad palatum. Sed cum nares siccæ sint & duræ, nec sit in eis humiditas aliqua, summopere cauendum est, ne hæc ægritudo aut ei similis ferro, aut acuto medicamine tågatur. Si autem quod in naribus exoritur caro mollis est, fluxerintque ex eis humores, & cum nares stringuntur, inueniuntur molles, & cum tåguntur tactus non sentitur solidus, non est timendum quin ex medicaminibus acutis & ferro mederi possint.

De amissione odoratus. Cap. XL.

**C**um sensus quo odoranda percipiuntur, amissus fuerit, neque in naribus caro superflua creuerit, & aer ita leuiter vt prius attrahit, & oculi ac sensus naturaliter existunt, naribus erit insufflādus puluis adeo subtilis vt alcohol, qui fiat ex cōdisi & artemisia & sale armoniaco. Aegro quoque precipiatur vt nares vaporibus ex aceto calido præcedenti multoties apponat. Si autem hæc non suffecerint, quod nominabimus naribus insufflet, cuius descriptio hæc est & nigelle, fellis gruis, coloquintide,

hellebori albi, omniū ana partes equales, puluerizent & ponātur in vrinæ cameli Arabici quātitate tanta quæ ea cooperire possit, & ponātur ad solē donec siccentur, deinde fiant ex eis sief. Cūmq; necesse fuerit, vnum ex eis lentis habēs magnitudinem in oleo sansucino intinctum, naribus immittatur, optimū enim ad hoc existit. Si autem ex hoc quod naribus immittitur fortis sequatur dolor, oleum de semine cucurbitæ eis immittatur, & aqua calida super caput fundatur, & forbeat calida ea quæ humectant vt ptisana, & quod fit de aqua furfuris, & de farina & similia. Et hoc quidem est medicamen ad amissionem odoratus probatissimum, quod sic conficitur : Nigella puluerizetur donec fiat vt puluis, & misceatur cū oleo veteri, deinde æger implens os suum aqua reclinet caput retro quāto plus poterit, & tunc ex prædicto medicamento aliquantæ guttæ naribus distillantur. Aegro quoque præcipiatur, vt quātum ei possibile est aërem extrinsecum interius attrahere nitatur, quod in tribus diebus & tribus vicibus fieri cōuenit. Si autem mordicatio superuenerit, fiat hoc quod prædiximus.

De dolore dentiū & gingiuarū. Cap. XLI.

**S**I gingiua cum dolore dentium fuerit sanguinolenta, & apostemosa, & rubea, fueritq; apostematio cum pulsatione, extrahatur sanguis cum vētosis, phlebotomia ex cephalica prius facta. Deinde in ore aliquandiu acetum & oleum rosatum teneat, quod postquā eiecerit, idem iterum faciat, post hoc oleum rosatum in ore teneat. Et si ex hoc non euaserit,



fueritque pulsatio vehemēs & cum inflammatione, camphora & piretrum terantur, & in radicibus dentium ponantur, cūmq; dissoluta fuerint, iterum mittantur: cotum quoq; oleo rosato illinitū desuper ponatur. Quod si dolor aliquando augmentetur & vehementior fiat, opij sexta pars drachmæ vnius, in oleo rosato dissoluatur, ex quo cotū illinitū radici dolentis dentis adhibeatur. Si autē nondū sedetur, locus scalpellandus est, & sanguisugæ superponendæ sūt. Gingiua vero si nō fuerit sanguinolenta, nec apostemosa, nec dolor est cū pulsatione, neq; in facie fuerit inflāmatio, aut dolor acciderit post fastidium & satietatē, & post coenam, comedentq; ex cibo frigido multū, venter ægri ex pilulis cochijs soluendus erit, & dolentium dentium radices ex hoc medicamine fricandæ sunt, quod sic fit, Sumantur piretrum, sinapi, scitarragi indi, baurach, piper, zinziber, & ex eis puluerizatis dentium fricentur radices. Cotū quoque eis illinitū super dentiū radices ponatur, postq; æger os ex aceto in quo piretrum & mentastrū atque origanum cocta fuerint, colluerit. A foris præterea panicum siue miliū in sartagine torrefactum super maxillam est ponendum, aut ex piperis puluere melli commixto dens & ei⁹ radix fricetur. Et si hoc non suffecerit, in dentium radicib⁹ hæc thyriaca ponatur, quæ & castorei, assæ foetide, piperis, zinziberis, storacis, opij, omniū ana partes æquales, conficiātur cū melle & administrētur. Aeger præterea per aliquantulū temporis à comestione absteineat, maneāq; famelicus & ingrediatur balneū, & vtatur motu.

Si autem nec sic quiescat, ferrum ignitum in radicem dentis multoties apponatur, aut eradicetur. Si vero dens corrosus fuerit, repleatur ex medicamentibus quæ nominabimus, & quæ sunt corrosiua, aut extrahatur.

De medicinis extrahentibus & confringētibz dentes. Cap. XLII.

**M**edicamen quod cum in dente corrosoponitur, ipsius sedat dolorē, ac ipsum confringit. Sumātur Kebikengi, & piper, & trita ex alkitrano cōspargātur, & impleatur ex eo. Medicamen quod dentes debiles ac dolētes qui sunt extrahēdi, eradicat. Cortices radicū mori, & radicū capparis, & piretrum, & lac titimalli, atq; lac anabulę, & arsenicū rubeū, & radix colocynthidæ sumātur, & trita ex tāto aceto quod eis sufficiat conspurgātur. Acetum quoq; per hebdomadā vnā semel in die vt prius addatur. Post hoc dentes in circuitu scalpellentur, & ex prædictis decies in die epithimentur, donec ad mouendum sint faciles, & sic extrahantur. Aut fiat epithima ex fece aceti acutissimi per multos dies, & postea extrahantur. Aut ranæ fluuiales in oleo coquātur donec dissoluātur, cūmq; necesse fuerit, dentiū radices scalpellentur, & ex oleo isto multoties inungantur, donec facile moueri possint, postea cum instrumēto extrahendi dentes euellantur.

De dentium congelatione & stupore. Cap. XLIII.

**P**ortulaca & amygdalæ amaræ masticeantur, aut his similia. Aut fiat fricatio cum sale, & masticeetur cera.

De dentibus qui dolent cum à re frigida tanguntur. Cap. XLIII.

**O**leum calefactum in panno desuper est ponendum, aut vitellus oui assatus calidus multoties masticaretur, aut calidum panem multoties mordeat, aut fiat fricatio ex balsamo, aut ex oleo de lilio syluestri.

De alcola, seu pustulis linguæ, & vlcerationibus oris. Cap. XLV.

**S**i pustule fuerint rubeæ, fumantur antheræ, amyli, spodij, lentium excorticatarum, feminis portulacæ, coriandri sicci, seminis senæ de Mecha, omnium ana partes æquales, camphoræ parum, ex his puluerizatis fiat fricatio, & cum aceto mixta, & oleo rosato, & aqua rosata in ore teneantur, & sanguinis minutio cum ventosis fiat. Albæ vero si fuerint pustulæ, cum sale & melle fricentur, & syrup⁹ acetosus aut almuri in ore teneatur.

De gingiuis sanguinolentis.

Cap. XLVI.

**C**um ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauerit, vtriusque arsenici, scilicet rubei & citrini, calcis, gallarum, aluminis, omnium partes fumantur æquales, ex quibus puluerizatis, & cum aceto mixtis, parui formantur troisci. Cumque necesse fuerit ex eis puluerizatis, sumatur quantum est sexta pars drachmæ vnius, & fricetur gingiue ex eo optimè, & permaneat sic parum. Deinde teneat oleum rosatum in ore. Est enim hoc mirabile ad hanc ægritudinem curandam & putredinem, & herpetem estiomenum, qui est in ore.

De casu vel elōgatione vuulæ. Cap. XLVII.

**C**Um æger senserit aliquid radici linguæ suæ insistere, aut gutturi, & cum iubetur aperire os & extrahere linguam, videtur vuula eius iam esse fluxa & elongata, ramech & sal armoniacum sumātur, & bene puluerizata, cum instrumento insufflandi, super vuulam insufflentur, & ex eis in summitate prædicti instrumenti aliquid ponatur, & radici vuulæ cū eo dirigatur, & ipsa cum instrumento parum exterius extrahatur. Aut granatum acetosum cum pulpa sua teratur, & fiat ex eo gargarismus. Quod si diu permanserit taliter, & elongata fuerit, eiusque pars superior subtiliata, & caput eius rotundum fuerit, tunc radicitus erit incidenda. Cauendum tamen est, ne antequam ita ut diximus sit disposita, incidatur, ex hoc enim sequitur quandoque sanguinis fluxus, qui constringi non potest.

De sanguisugis quæ ingrediuntur guttur. Cap. XLVIII.

**C**Um aliquis in gutture suo titillationem senserit, & sanguis subtilis inde manauerit, existimandum est tunc sanguisugam in ore esse: & præcipue si aquā loci in quo sanguisugæ fuerint, biberit. Os igitur ægri est aperiendum, & lingua extrahenda, & inferius premenda, & guttur in sole est inspiciendum, & si sanguisuga in loco propinquo pendere visa fuerit, cum forficibus quibus sagittæ educuntur, extrahenda erit, quod hoc modo fiet. Caput a quo pendet est stringendum, & sic extrahatur. Quod si non fuerit manifesta, æger multoties

gargarizet sinapim cum aceto, quia de loco in quo est mouebitur. Aut fiat gargarismus ex aceto & affa foetida, aut ex aceto & sale. Nigella præterea & sinapis trita insufflentur gutturi: fiat etiam gargarismus ex succo cepæ. Si autem post eius casum remanserit ægro sanguinis resudatio, fiat gargarismus ex apozimate in quo cortices granati, & balaustix, & sumach cocta fuerint, & gutturi insuffletur puluis de balaustijs, & thure, & sanguine draconis & amylo. Si autem sanguisuga stomacho annexa fuerit, medicamina quibus vermes expelluntur, sumantur in potu. Ex his etiã quæ sanguisugam exire faciunt, est ut æger balneum ingrediatur, & moretur in eo, donec magnam patiatur sitim, & tunc aquam in niue infrigidatam frigidissimam scilicet in ore aliquandiu teneat, cumque coeperit tepesceri, eam expellat, & aliamumat. sanguisuga enim quandoque venit ad os, frigiditatem quærendo.

De ingrediētib⁹ os siue guttur. Cap. XLIX.

**C**VM illud quod guttur ingredit, & infigitur in eo, aut in meri, aut fuerit bol⁹ magnus, aut ei simile de his quæ non habēt frusta scissa contenta in eis, aut acuta, confert plerunq; percutere ægrum in collo posterius, & multoties, & aquā sæpē trajcere, fortassis enim descendet inferius. Aeger quoque balneum ingrediatur, & oleum multoties trajciat, quod postquam factum fuerit, magnos deglutiat bolos. Quod si non descenderit, instrumentum, quo huic simile inferius duci consuevit, in os mittatur. Est autem instrumentum illud de plū,

bo, quod cum sit reti simile, est longum, gibbositatem in se habens.

De grauedine linguæ. Cap. L.

**C**VM lingua absque alijs membris grauedinem passa fuerit, & æger neque febrē, neque acutam incurrerit ægritudinem, sal armoniacum, & piper, & zinziber, & sinapis alba, ac piretrum, & staphisagria, & baurach, atque origanum, & sal indum, & nigella, & sansucus siccus sumantur & in aqua coquantur, & fiat ex eis gargarismus. Caueat tamē patiens ne ex eo aliquid traijciat. Aut æger ieiunus multis diebus gargarizet almuri nabati, aut fiat gargarismus ex aceto & piretro. Postquam verò gargarizare cessauerit, sumantur salis armoniaci, piretri, piperis, sinapis, omnium partes æquales, & ex eis bene puluerizatis lingua diutius fricetur. Quòd si cum linguæ grauedine auditus, ac reliquorum sensuum grauitas fortis affuerit, fiat ægri curatio secundum doctrinam qua paralyssis curatur. Si autem loquela in acutis febribus aggrauata fuerit, & videris ipsam cum grauitate in loquela extenuatam, & abbreviatam, & spasmatam, aqua calida ab alto super sphondyles colli, & auris principia fundatur, & cum oleo fricentur. Aeger quoque oleum tepidum in ore tenere debet. Et si diu est ex quo loquela minui non cessauerit, vel etiā semper, considerandum est, an ligamentum quo inferius lingua connectitur, maius sit quàm debeat. Quòd si ita fuerit, ex eo parum est incidendum, & zegi puluerizatum immittendum.

De lingua quæ adeò tumescit vt os egrediatur. Cap. LI.

**C**um contingit linguā adeò inflari, vt præ magnitudine os egrediatur, fricanda est ex cepis, aut ex citri acetositate, aut cū ribes, aut ex granato acetoso, donec saliuā multa ab ea profluat. Hoc nanque modo detumescet, & ad primam redibit mensuram. Si autē non sufficit, fiat fricatio, ex sale & aceto. Et si nondum sufficit, fiat minutio ex vtrisque cephalicis prius, & postea ex venis quæ sunt sub lingua.

De glandula quæ sub lingua nascitur, & vocatur ranula. Cap. LII.

**C**um sub lingua glandula nociua fuerit, in principio ex sale armoniaco & gallicis fricanda est. Si autem vetusta fiat, ex medicamine gingiue sanguinolentæ fricanda est, quod est medicamen acutum. Aeger autem acetum, & sal in ore teneat.

De pustulis & apostematibus accidentibus linguæ. Cap. LIII.

**I**sta ex eisdem sunt curanda, ex quibus alcola, quas supra nominauimus, & squinantia sanantur.

De squinantia. Cap. LIIII.

**C**um in glutiendo sentitur angustia, ad est passio quæ squinantia vocatur. Cuius grauitas vel leuitas secundum angustię quantitatem deprehendi potest. Cumq; cum traijciendi angustia fuerit in facie, & oculis rubedo & repletio, in principio curationis

cephalica phlebotometur, & gargarism<sup>9</sup> ex succo granati muzi cum carnositate sua fiat; aut ex rob mali maciani, aut ex rob mori de Seni. Et post hoc fiat gargarismus cum aqua rosata in qua sumach fuerit infusum. Quod postquā per tres dies sic factum fuerit, & veriter ex succo fructuum sicut prunorum, tamarindi, cassiæ fistulæ, & tereniabin solutus fuerit, fiat gargarismus ex apozimate ficuū citrinarum, & passularum, aut ex medulla cassiæ fistulæ, cum hydromelle. Quod si passio inueterauerit, ex gargarismis & insufflatione fortium medicamentum, quæ dicturi sumus, curanda erit. Si autem in facie non fuerit rubedo, fluxeritque ab ore saluæ multitudo, & æger fuerit humectatus, in principio soluatur venter ex pilulis cochijs, & fiat enema ex chysterio acuto, quod in capitulo de apoplexia nominauimus. Cum tamen passio incœperit, fiat gargarismus ex syrupo acetoso, aut cum hydromelle & pipere & oximelle, & deinde ex almuri nabathii. Fiat etiam gargarismus ex hydromelle & sinapi. De his præterea quæ malæ squinantiae conferunt, est vt ex venis quæ sunt sub lingua fiat minutio, & ventosæ absque scarificatione in collo ponantur, & epithimetur collum ex melle anacardino donec vesicæ in eo generentur, & fiat gargarismus cum sinapi, & gutturi fiat insufflatio ex hoc medicamine, quod sic fit. Sinapis, sal armoniacus, piretrum, nitrum, assa, piper, mentastrum fumantur, & ex eis cum hydromelle fiat gargarismus.



De tussi. Cap. LV.

**C**um tussis acciderit, fueritque aspera & sicca, & cum rubedine & calore, ægro muraba violatum & ptisana tribuenda erunt. Fabas quoque excorticatas & spinachias cum oleo de amygdalis dulcibus in comestione accipiat. In ore verò semper tenere debet pilulas bichichias. Aquæ autem quam bibit syrupus violatus est admiscendus. Confectio pilularum bichichiarum, & succi liquiritiæ, zuccari albi, amborum ana drachmas decem, amyli, dragaganti, amygdalarum dulcium excorticatarum, omnium ana drachmas quinque. Ex eis cum muscilagine seminis citoniorum conspersis informantur pilulæ. Quod si cum tussi multum affuerit sputum, quod cum expuendo expelli non potest, nocumentum infert: sed neque febris, neque vehemens ventris solutio ipsam comitantur, ex his trociscis dandum erit infirmo, qui & seminis feniculi, seminis apij, succi liquiritiæ, capilli veneris, amygdalarum, omnium partes æquales. Ex his cum muscilagine seminis lini conspersis informantur trocisci, ex quibus drachmæ tres tribuantur. Decoctionem autem, qua in hac ægritudine vtendum est, in capitulo de catarrho iam descripsimus, cui tamen drachmæ quinque capilli veneris sunt addendæ. Quod si tussis antiqua & nociua fuerit, adeo vt ægrum in nocte dormire non permittat, pilulæ storacinae sunt dandæ, quæ & myrrhæ, storacis, opij, omnium ana partes æquales, informantur ex eis pilulæ ad lupinorum similitudinem, ex quibus vna aut duæ patienti tri-

buantur. In potu verò sumat syrupum de papauere, & comedat semen albi papaueris cum zuccaro. Qui hanc præterea patitur ægritudinem, vitet in comestione acetosa, salsa, pontica, acria, atque amara. Suffumigium ad antiquam tussim & sputum foetidum, quod ꝛ. aristologia, myrrhæ, storacis, galbani, omnium partes æquales, arsenici rubei ad pondus omnium: omnia puluerizata ex butyro vaccino conspergantur. Ex quibus magdaleones ad pilæ parua similitudinem informentur, & cum necesse fuerit, in ieiunio ex vno eorum per trajectorium suffumigetur æger.

## De asthmate.

## Cap. LVI.

**C**Um aliquis assidue patitur tussim, & aërem attrahit quemadmodum fit post cursum, aut post vehementem motum, & cum iacet supinus est ei deterius: sed cum sedet, est ei melius: Decoctio ei danda est, quæ ꝛ. ficuum citrinarum drachmas decem, dactylorum multam humiditatem habentium, seminis apii, seminis feniculi, capilli veneris, liquiriciæ, hyssopi, prassij, omnium ana drachmas quinque: coquantur in tribus libris aquæ dulcis donec redeant ad vnam, & colentur. De hac verò decoctione tribus diebus ægro in potu tribuatur, cum pondere duorum aureorum huius confectionis, quæ ꝛ. succi liquiriciæ, hyssopi, capilli veneris, omnium ana drachmas decem, cordumeni, piperis, amygdalarum amararum, aristologia rotundæ, seminis vrticæ, omnium ana drachmas quinque, mellis despumati qd. sufficit.

Hæc enim confectio superfluitates quæ sunt in pectore mirabiliter expellit, & est optima. Danda est itaq; per hebdomadam vnâ continuo. Deinde æger postq̃ comederit sinapim & mel, vomere cogendus est, & venter ex his pilulis soluendus, quæ recipiunt, agariçi, grana hordei octodecim, coloquintidæ interioris, grana hordei sex, elaterij grana quatuor, succi liquiritiæ drachnam semis, fiant ex eis pilulæ: & sufficiunt ad dosim vnâ. Post hoc quoq; iterum redeat ad bibendam cōfectionem & decoctionem sumendam, & postremo ad vomitū & ventris solutionem, vt prius. Hoc faciendū est donec æger sanitati restituatur. Interim tamen à cibis grossis & stipticis & acetosis abstineat.

De Pleuresi. Cap. LVII.

**C**UM aliquis sub costis suis dolorem sentiat, tit pungitium, & proprie quando sicca patitur tussim & febrem, expedit, vt si dolor super partem costarum & furculam tendit, fiat minutio ex basilica ei⁹ partis in qua est dolor, nisi totum corpus multo sanguine repletum fuerit; tunc enim ex latere cōtrario sanguinis detractio faciendâ est. Aegritudo quoque si iam per aliquot dies, à sui principio infestauerit ægrū, phlebotomia similiter à parte dolente faciendâ est. Quod si dolor inferius ad partem costarum posteriorem tendit, venter ex decoctione quâ in capitulo de rheumatismo descripsimus, est soluendus. Melius tamen est vt phlebotomia fiat, deinde aqua hordei cum zucaro assidue tribuatur. Et si videris tussim eius vehementis siccitatis, da ei in diluculo omni die

ruleb, deinde da ei in potu aquam hordei . Et si æger fuerit debilis , nutriatur cum pane & ex zuccaro . Si autem fortis fuerit , aqua hordei vsq; ad diem quartum sufficiat . Cùmque scire coeperit , decoctionem quam in capitulo de rheumatismo nominauimus , quotidie sumat , antequam aquam hordei bibat , donec sanetur . Si autem febris & acuitas perseuerent , & æger in excreatione difficultatem patiat , detur decoctio quam in capitulo de asthma nominauimus , quod similiter est faciendum cum saniei sit excreatio . Quòd si in principio passionis quod excreatur nigerrimum , aut valde citrinum apparet , & sic permanserit , & febris non quieuerit , neque calor vsque ad diem septimum , timorosum est . Et si cum hoc toto aëris attractio non alleuietur , & in pectore fuerit oregmon , aut in maxillis rubedo , & in oculis labor , morti est propinquus . Si autem exterius in latere apparuerit rubedo , aut apostematio , & cum premitur locus , dolet , ponatur desuper ventosa , aut emplastrum ex sinapi , & ficibus , & dimittatur ibi donec locus vlceretur . De his verò quæ ex errore stolidorum ad augmentum nocimenti accidunt hanc ægritudinem patientibus , est cum dolor in principio sentitur sub costis , existimant grossam fore ventositatē , ideòque electuarius diamuscum , aut ei similia ægro tribuunt , eumque omnino interficiūt . Hæc passio vocatur birsen , cuius causa est apostema quod oritur interius sub costis hypochondriorum .

## De peripneumonia. Cap. LVIII.

**C**Um homini superuenerit febris, & in anhelitu tantam patitur constrictionem, ut se præfocari putet, & in maxillis ita vehemens sit rubedo, ut tinctæ videantur, & anterior pectoris pars dolet, & tussis adest, & quod cum excreatione emittitur existit spumofum, & in pectore sentitur grauitas sine punitione & sine calore. Cui omnia hæc accidunt acutum in pulmone patitur apostema, & vocatur hæc passio peripneumonia. In principio igitur curationis eius basilica minuenda est, deinde æger ex eis, quibus medicatur pleuresis, curandus est.

## De sputo sanguinis &amp; saniei.

## Caput

## LIX.

**C**Um sanguis cū rascatione aut paruo sonitu qui fit sine tussi, egreditur, non est ægro inde timendum, poterit enim sanari gargarizando ea quæ in capitulo de Squinantia nominauimus, & regimen subtiliando. Cum vomitu quoque si exierit sanguis non magnum affert timorem: curatur nanque hoc phlebotomando ægrum, & si comederit stiptica sicut sumach & succum vuæ acerbæ. In potu præterea sumat ex boli armeni, gūmi arabici, balaustiarum, sanguinis draconis, thuris, omnium ana partibus æqualibus, & dentur ex eo drachmæ tres, cum rob simplici de citonijs. Quibusdam autem solet accidere sanguinis exitus cum interpolatione, ex quo nullum sentiunt nocumentum, imo remedium, ideoq; sic est dimittendus. Quod si cum tussi superueniat sanguinis egressio,

est timorofum. Est tamen incipiendum in curatione ægricum phlebotomia ex basilica, deinde ex trociscis istis in potu est tribuendum, qui & thuris, sanguinis draconis, amborum anadrachmas tres & tertiam, charabæ drachmas quinque, æmathitis, terræ sigillatæ, amborum anadrachmas decem, aluminis drachmas duas semis, balauftiæ drachmas tres, opij drachmas duas, raved Seni drachmas duas, ex his omnibus fiant trocisci decem, de quibus quotidie vnus in potu sumatur cum succo ozimi maioris aut portulacæ. Et si ægritudo vehemens fuerit, alius circa noctem dandus est. Adiutoriorū quoque ac coxatum partes superiores sunt ligandæ, & extremitatēs fricandæ. Pectus etiam præcipuè si in eo fuerit locus dolens, ex trociscis prædictis cum aceto & aqua epithimetur. Eius præterea cibaria succum vuzæ acerbæ, & sumach & eius similia admixta habeant, & patientes supinus iacēs, de terra sigillata aliquid post aliquid paulatim comedat.

## De Phthisi.

## Cap. LX.

**C**um aliquis carniū diminutionem pati videtur post tussim ex chronica passione, & sputo sanguinis, aut saniei procedente, lac asininum in potu tribuatur: quod si inueniri non poterit, caprinum cum paucō zucaro dandum est, cum quo etiam panem sæpe comedat, ipsūque quanto plus potest, loco aquæ in potu sumat. Vinū tamen subtile & temperatū aliquando est tribuendum. Nutrimentū autem ægri sit ex carnibus auium & hoedina.

Aeger præterea ante comestionem & post, balneum ingrediatur, quod non sit calidum sed tepidum, & in semicupio moram faciat. Summo pere verò cauendum est, ne venter soluatur. Cui tamen, si solutus fuerit, ex huius pulueris bibitione succutrendum est: qui & gummi arabici, spodij, boli armeni, seminis myrtini, omnium ana drachmam vnā, fiat ex eis puluis, de quo in die drachmæ tres cum syrupo de papauere albo aut rob. myrtino. datur. Huius quoq; pulueris bibitio omnibus ventris constrictione indigentibus, qui tussim patiuntur, remediū affert. Cui plerunq; adduntur xilocaractæ de Syria, & bdellium de Mecha. Quod si lac ægro febrem generauerit, auferendū est ei lac, & ptisana quousq; febris recedat, danda, deinde lac ei denuo tribuatur. Et si febris iterū redierit, remoto lacte, ptisana est danda, post cuius recessionē, vt prius ad lac est redeundum. Hoc autē semper est faciendum cum necessitas vrget: & venter summopere custodiendus ne soluatur.

De tremore cordis. Cap. LXI.

**S**I cum cordis tremore fuerit pulsus velocitas & febris, æger ex basilica est minuendus, & troiscici camphorati cū succo maiorum acetosorum in potu sunt tribuēdi, qui & spodij, seminis cucumeris, citrulli, endiuia, lactuca, portulacæ, rosarum, sandali albi, omniū partes æquales, & pro vnoquoq; pondere aurei vnus ex eis, sumatur caphoræ triū granorū hordei pōdis, ex quibus cū succo macianorū confectis, fiant troiscici, de quibus in potu quotidie vni⁹ aurei pōdis, quaq; die tribuatur: quod per

duas hebdomadas fieri conuenit. Si autem hæc non suffecerint, lac de quo butyrū sit extractū, ad bibendum detur. Ipse verò nutriatur ex pul-  
lis cum aceto & succo vīæ acerbę, & ex aceto  
fo. Syrupum præterea acetosum de zuccaro fa-  
ctum bibat. Si autem cum cordis tremore non  
fuerit febris, trocisci muscati in potu sumantur,  
qui & masticeis, spicæ, xiloaloës, cinamomi, ga-  
ryophylorum, galliæ muscatæ, nucis muscatæ,  
cubebæ, cardamomi maioris & minoris, corti-  
cis citri, omnium ana pondus vnius aurei, mu-  
sci sextam drachmæ vnius: ex his omnibus cū  
vino redolente conspersis, fiant trocisci. Hi autē  
trocisci conferūt syncopi, & tremori cordis. Ele-  
ctuariū diamuscum pretiosum quod est ad syn-  
copim & tristitiam cordisq; tremorē & tædiū  
faciēs, & masticeis, cinamomi, seminis ozimi ma-  
ioris, seminis ozimi garyophylati, seminis me-  
lissæ, seminis sisimbrij, seminis sansuci, macro-  
piperis, omnium partes æquales, ex quibus om-  
nibus puluerizatis drachmæ decem sumantur,  
margaritarum minutarum, coralli rubei, cube-  
bæ, setæ crudæ, charabe, been albi & rubei, fo-  
lij, omniū ana drachmæ decem, musci puri dra-  
chma semis, conficiantur cum melle de miroba-  
lanis chebulis. Hoc enim electuarium ad frigi-  
ditatem stomachi, & digestiue ægritudinem  
optimum existit.

De colirica seu coeliaca passione.

Caput LXII.

**C**Um paruus dolor, pūctio, & tristitia ali-  
cui superuenerit, affuerintq; cum ea vel  
post ipsam vomitus & ventris solutio,



aqua calida multoties cōtinuē in potu tribuaf. Et si adhuc perseuerauerint vomitus & ventris fluxus, aqua calida iterū detur. sedabitur enim passio. Cum autē ægritudo quieuerit, æger balneum ingrediatur, in quo per vnus horę spatiū moretur. Egressus autem de balneo, leui alatur nutrimento, deinde dormiat. Sed licet vomitus & ventris fluxus vehemētes fuerint, & symptomata terrefacientia superuenerint, non tamen est timendum, imò cū medicaminibus quæ ego nominabo succurrendū. In principio itaque troscisci de olibano cum aqua & niue & rob granatorum dentur semel, qui iterum etiā sunt dādi si vomitus non cessauerit. Duo quoq; adiutoria & coxæ in supremis partibus ligētur, & aq̃ in niue in frigidata super crura & pedes fundaf, & in ipsam etiā mittantur. Vēter quoq; ex sandalis, rosis, cāphora, gallia, aqua rosata conspersis epithimetur, & pannus aqua rosata in niue in frigidata infusus desuper ponatur, qui postq̃ tepesfactus fuerit, est remouēdus, & alius vt prius desuper mittendus. Ad potandum autē paulatim tribuatur vinum vetus, temperatum cum rob granatorum: & quando vomuerit, iterum tribuatur. Panem quoq; in succo granatorū infusum, cogendus est sumere cum vino, & comedere. Quem si vomuerit, iterum dandus est, donec quiescat. Quòd si syncopis supuenerit, muscum cum vino dari cōueniens est: inde vim inferendo, & succus carnis hoedinæ & pullinæ cū pauco citoniorum succo in vino mixtus, in potu est tribuendus. Pulli præterea sunt assandi, & ante nares ipsius discerpēdi, thuy etiā dandū est,

vt ipsum mastice & paulatim traijciat. Et postremo bolū Chorascanū cum camphora cōditū tribuatur. Quicquid autē de huius passionis cura nūc vsq; diximus, donec vomitus sedet, & stomachus cibū recipiat, fieri cōuenit. Postq̃ vero stomachus ipsius recipere cibū poterit, nutriendus est æger, & parū vini veteris bene redolētis in potu sumat, & dormire icipiat. Trocisci de olibano ad vomitū dicti, & boli Chorascani, thuris, amborū ana drachmas decē, cubebæ, cardamomi, āborū ana drachmas duas semis, camphoræ, galliæ, garyophylorum, omniū ana sextam drachmæ vnius: fiant trocisci pondere aurei vnius. Hi enim vomitui multum conferunt. Rob de malis granatis, Succus granatorū acetosorum sumatur, & per noctem vnā aut amplius dimittantur, donec quod grossum est in fundo resideat, deinde coquatur & despumetur donec iuleb similitudinē habeat, in quo ab igne deposito adhuc tamen calido, menthæ viridis stipites mittantur, & in ipso manere dimittantur, quousq; infrigidetur: cūq; infrigidatū fuerit, extrahātur. Ad cuius similitudinē syrup⁹ de citonijs, & syrupus de malis macianis fieri cōuenit. Si autē vomit⁹ horā aliq̃ nimis inualuerit & supfluxerit, magna vētosa stomacho supponat.

De debilitate stomachi. Cap. LXIII.

**C**Um stomachi debilitas cum pauca siti, & tarda cibi a stomacho descensione, & acido ructu fuerit, fuerintque omnia accidētia hæc parua, neq; fuerint vetusta, stomachus cū trociscis de rosis erit curandus. De quibus æger quotidie in mane pondus aurei vnius

& dimidij cum vncia vna decoctionis de seminibus sumat. Decoctio autē de seminibus hæc est. Sumatur ciminum Nabathi & ameos, & bulliāt in mina aquæ donec aqua fiat rubea, de qua postea cum trociscis de rosis, vt prædictum est, in potu tribuat. Trocisci verò de rosis sunt, qui, & pulueris rosarū rubearū drachmas tres, xilaloës, spicæ, masticis, xilocassiae, squinanti, cinamomi, absynthij, omnium ana dachmam vnam: conspergantur ex vino veteri, & informantur trocisci. Nutriatur verò ex his quæ cito digeruntur, & paucorum sunt humorum, ac paucarum superfluitatum, quæ etiam ex redolentibus & seminibus sint cōdita, sicut sunt calagiæ & mutagenat. Ipse quoque ante comestionem multo vtatur exercitio, & aquā minus solito bibat, & post comestionem multum dormiat. De vino quoq; veteri & puro parum bibat, totāmq; nutritionē minuatur. Quod si hæc accidētia vetusta fuerint, electuarium dyacimini, dyaolibanī, amborū ana vnus aurei pondus, cum vncia vna veteris vini puri in potu sumatur. Regimē autem eius sit vt prædiximus. Electuarium dyaciminum, & cimini Carmeni drachmas centum, zinziberis drachmas viginti, piperis drachmas decem, foliorum rutæ, baurach panis, amborum ana drachmas decē. Hæc omnia cum melle despumato conficiantur, & detur de hoc electuario, si venter strictus fuerit. Quod si solutus fuerit venter, electuarium dyaolibanum est dandum. Cuius descriptio in capitulo de ventris solutione continetur. Si autem hæc non suffecerint, squama ferri cum vino tris

buatur. Scorizæ autem ferri cōfectio hæc est, & seminis apij, seminis foeniculi, anisi, cimini, ameos, aniuden, origani, cheisim, carui, seminis coriandri, melanopiperis, macropiperis, cinamomi, thuris, spicæ, garyophylorum, nucis muscatæ, ciperi, zinziberis, omnium ana pōdus aurei vni<sup>9</sup> us, scorizæ aureos decem: omnib<sup>9</sup> sextuplum vini addatur, & coquantur donec ad medietatem redeant, & coletur. Deinde æger de hoc syrupo, postquam colabitur, pondus drachmarum triginta quotidie bibat, & nutritionem alleviet: quod per tres hebdomadas faciēns, caueat sibi ab acetosis & à fructibus recentibus, & ab aqua frigida: vinum verò mensuratè bibat. Emplastrum stomachum confortans & calefaciēs, & storacem, spicam, squinantum, absynthium, calamum aromaticū, masticem, ex his cum vino veteri & succo citoniorum cōspersis emplastrum super stomachum ponatur. Ad hoc præterea confert, vt stomachus fricando inungatur ex oleo quod fit ex spica nardi & cipro: & vt lana carminata in prædicto oleo calefacto inuoluta super stomachum ponatur, & cum panno ligetur. Æger quoq; vinum vetus bibat, aut miuam, aut hydromel. Miuam autem hoc modo fiat, Succus citoniorum muzorum fumatur, & per diem & noctem, vt residere possit, dimittatur & coletur. Deinde eius quod clarum est partes duæ sumantur, zuccari pars vna, vini veteris vna, & incipiat coqui suauiter & despumari, donec in iuleb similitudinē transeat: postea pro vnaquaq; libra ex toto, sumatur zinziberis, spicæ, cinamomi, garyophylorum, omnium ana

drachma vna, mastice drachmæ duæ: omnia hæc puluerizata in pāno ligentur, & intus, dum calidum est, mittantur: & cum infrigidari cœperit, pānus extrahatur & exprimatur, deinde syrup<sup>9</sup> recondatur. Quod si digestiua debilitas fuerit cū multa siti, & paucorū ciborū appetitu & foetido ructu, syrupus acetosus de citonijs bibatur. Syrupus acetosus de citonijs, & succi citoniorū acetosorum partem vnā, zuccari albi partem vnā, aceti clari quartam partem vnius: coquantur omnia simul, donec inspissentur. Est autem syrupus iste stomachi confortatiuus, & ad suas peragendas actiones iuuatiuus, & vehementiam inflammationis & incensionis, quæ in eo est, sedat. Ægri verò nutritio sit res in qua simul congregatur acetositas & stipticitas, vt est caro cum succo vuae acerbæ cocta, & cū malis macianis similiter cocta, & cū ribes, & facta ex alhulem & almofo, & illis similia ex cibis. De isto præterea detur puluere pluries, vt transglutiat, qui & rosarum rubearum drachmas decē, spodij drachmas tres, seminis coriandri drachmas quinq;. dosis eius drachmæ duæ cum succo granati mizi, & cum syrupo acetoso de citonijs. Si autē cum hoc quod diximus fuerit in corpore extenuatio & inflāmatio, ægro lac & aqua hordei dāda sunt. Ipse quoq; ex herbis humectantibus est nutriendus, vt sunt lactuæ, maluæ, cucurbitæ, citrulli, carnes hoedorum & agnorum lactentium, & pisces recentes. Balneum præterea anteq̃ comedat, & postq̃ comederit, & tinam quotidie ingrediatur. Et vinum clarum valde temperatum bibat, & assidue vtatur

quiete, & motum & exercitium vitet. Sitq; totum eius regimen vt eius qui corporis grossitiē adipisci desiderat. Et si cum hac dispositione inflammatio fuerit & incensio vehementissima, stomachus ex rebus frigidis erit liniendus, & aqua hordei danda: sitq; eius regimen vt ethicam habentis.

De dolore & apostemate stomachi.

Caput LXIII.

**S**I cum dolore stomachi adsit turbatio & nausea, ægro aqua tepida in potu est tribuenda, & vt vomat præcipiendum. Et si hoc non suffecerit, venter ex hiera pigra soluetur, quæ & pulueris rosarum rubearum, spicæ, masticis, xilobalsami, carpobalsami, cinamomi, xilocassie, assari, omnium ana drachmas quinque, aloës Scotrēsis duplum omnium: quod bene tritum cum alijs misceatur medicinis tritis, & cū panno sericino subtilissimo cribellatis, quarum trituration cum aloë secundo iteretur. Cuius dosis sit à pondere duorum aureorum vsq; ad drachmas duas. Ægro quoq; quotidie detur panis in vino & succo mali granati infusus, & in syrupo acetoso de citonijs. Quod si cum dolore fuerint ructuū multitudo & extēsis atq; singultus, ægro electuarius dyaciminū, & dyacalamentum, & aliæ confectiones quæ vêtositatem dissoluere consueuerūt, quas in capitulo de colica nominabimus, dandæ erunt. Cibaria verò eius sint calagiæ, & mutagenat cū seminibus. Vini veteris puti parum bibat, & vtatur motu, & ingrediatur balneū. Stomachus quoq; ex oleo de neriden, vt diximus, in pāno inuoluto vaporet.

Si autem cum dolore stomachi fuerit febris, & apostema manifestum, & cum tangitur, sentitur caliditas, eger prius ex basilica phlebotometur, & loco dolenti duo superponantur sandali, & rosæ, & camphora cum aqua rosata, & succo citoniorum. Nutrimentum verò eius non sit nisi sola hordei aqua & custodiatur à carne & vino & confectionibus quæ de melle fiunt, & bibat succum granatorum muzorum & rob de fructibus frigidis. Cùmque caloris ychementia sedata fuerit, ægro cassia fistula in succo endiuivæ dissoluta & bullita ac despumata, ad bibendum detur. Cum autem ægritudinis dies elōgati fuerint, & calor omnino quieverit, si remāserit apostema cum duritie, ex hoc emplastro epithimetur locus, quod, & violarum siccarum drachmas decem, rosarum rubearū drachmas quinque, spicæ odoriferæ, mastიცis, amborū ana drachmas tres, ciperi, squinanti, calami aromatici, omnium ana drachmas duas, farinæ fœnugræci drachmas viginti, florum camomille, seminis malvaufisci albi, farinæ hordei, omnium ana drachmas decem: conspērgātur omnia ex muscila gine seminis lini, deinde locus ex oleo de neriden repesfacto inunctus emplastretur ex prædictis per quatuor horas antequam comedat: & postquam cibus fuerit digestus, & stomachus fuerit euacuatus, ex oleo de neriden cum lana, ut diximus, vaporetur. Confectio olei nardini simplicis, & olei de been librā vnā, spicæ vnciam semis, mastიცis, costi, ciperi, squināti, calami aromatici, omnium ana octauā partem vnciæ vnius. omnia hæc puluerizata in prædicto

oleo posita ad solem per hebdomadam vnā vas-  
sis ore clauso dimittātur, deinde colentur & ex-  
primātur fæces, & scophæ quæ in manibus re-  
māserint, emplastris admisceātur, optimę enim  
erunt. Cum autem apostema in stomacho inue-  
terauerit, trocisci de spica erūt dandi, qui ꝑ. flo-  
rum squināti, xilocassie, raued Seni, calami aro-  
matici, spice, omnium ana drachmas tres, croci,  
myrrhæ, anisi, costi, piperis, omnium ana dra-  
chmam vnā, bdellij variij drachmas tres, ma-  
sticis drachmas duas, armoniaci drachmā vnā,  
informentur trocisci, quorum vnusquisque vnū  
pōderet aureum, ex quibus vnus quotidie cum  
vino cocto detur. Emplastrum quoq; istud fiat  
quod ꝑ. bdellij mollis drachmas decem, armo-  
niaci drachmas quinque, seminis been, seminis  
apij, amborum ana drachmas decem, spicæ, ma-  
sticis nigri, amborum ana drachmas quinque,  
ceræ drachmas tres, olei de neriden drachmas  
quindecim. Gummx in vino dissoluantur, de-  
inde omnia coniungantur, & fiat ex eis empla-  
strum. Ad dolorem tamen stomachi & epatis  
curandum, medicus valde eruditus est necessari-  
us, qui ipsorum diligenter attendat dispositio-  
nes. Nos tamen aggregationes, & summas ad  
hoc conferentes iam diximus, licet in quātum  
potuimus in hoc abbreviauerimus sermonem.

De singultu. Cap. L X V.

**C**um singultus post grossi cibi comestio-  
nem, aut vini valde temperati bibitionē  
superuenerit, aqua calida in qua ciminū  
& mentha & mentastrum & parum thuris bul-  
lierint, multoties in potu erit sumenda, & ægro



ut dormiat est præcipiendum, & venter vaporandus, & ieiunandum est ei. Cum autem per multos dies à comestione abstinuerit, iubendus est balneum sæpe ingredi, deinde paucis cibis, desiccantibus tamen, est alendus, sicut sunt galangia, & mutagenat cū seminib⁹: & vini puri parū in potu tribuēdū. Et si hæc nō suffecerint, trocisci illi dādi sunt, q̄ dicunt trociscide thure, & x. thuris drachmas quicq; enulæ drachmas tres, mēthastri, foliorū rutę sicce, amborum ana drachmas duas, seminis ❖ nemen drachmas tres semis, iforment ex his trocisci pōdere vni⁹ aurei, ex qb⁹ vn⁹ in die cū apozimate cimini tribuat. Qz si singultus post febrē acciderit, fueritq; cū eo tribulatio, aut nausea, aut sitis, aut in ore siccitas, aqua calida ægro multoties tribuēda erit, non tamen repente sed paulatim. Et si sedatus non fuerit, aqua hordei cum oleo de amigdalibus dulcibus detur. Sphondyles quoq; colli & dorsi ex oleo tepido inungantur & fricentur, & muscicago psyllij cum iuleb & succo granati in potu tribuatur. Singultui præterea & sternutationi confert retinere anhelitum.

Alias  
m.  
j.

De caninō appetitu. Cap. LXVI.

**C**VM aliquis famem assiduē patitur, & cibus post comestionem adeo grauat eū, ut aut vomere aut per inferiorem regionem ipsum eijcere cogatur, rizum dandum est ei: quod dum coquitur ex liquore qui fluit ab agno qui in furno assatur, & impinguat, & cauda & ei similia, nec nō ex omni cibo qui vinctuosus est: & vinum vetus purū dādum est, de quo quantum poterit bibat. Deinde præcipiendū ei

est vt euomat, & hoc regimine cōseruandus est donec sanetur. Quod si neq; cibus eum grauat, neq; ipsum euomit, neq; per secessum expellit, carnes vaccinæ sunt dandæ, & frumentum coctum vt puls, & rizum cum lacte, & aquam frigidam in potū sumat, & in aëre frigido moreatur. Hac autem ægritudine laborans nil acetosum & stipticum neq; acutū comedat, sed dulcibus & vnctuosis solū vtatur.

## De dolore epatis. Cap. L X V I I.

**C**um quis male fuerit coloratus, & cum hoc malam habuerit formam, habueritque dolorem in dextro laterē apud costas posteriores, & fuerit eius malus color citrinus, & fuerit cum hoc in ore siccitas, & sitis vehemens, aqua hordei, & succi herbarū, vt endiuie & solatri, & cuscute, cū Syrupo acetoso ex zucaro albo facto in potu tribuatur. Emplastrum quoq; ex duob; sandalis & rosis, & cāphora, & aqua rosata, cū pāno lineo loco superponat, qđ hoc modo fiat, Pānus in p̄dictis inuolutus superponat, cūq; tepere coeperit, remoueat, & alius loco eius apponat. In potu p̄terea sumat granatorū succū, & robub qui in frigidatē cōsueuerūt. Hic quoq; a vino & a cōfectionib; que de melle fiūt, sibi caueat, & a cibis calefaciētib;. Et sumat trociscos de berberis, q & succi berberis drachmas decē, seminis endiuie, seminis citrulli, seminis portulacē, omniū ana drachmas tres, rosarū drachmas duas, raved seni drachmā vnā, spicæ drachmam semis. In formētut trocisci ponde aurei vnius, ex quibus detur vnus cum syrupo acetoso de succato, aut cū succo granati.

Venter quoque si necesse fuerit cum succo fructuum soluatur, ut sunt pruna & tamarindi, & zuccaro albo. Quod si mal<sup>9</sup> color qui est cū dolore epatis, fuerit albus, medius videlicet inter eum, qui est cum fluxibilitate, & eum qui est cū tumore, fueritque cum eo vētris solutio & palpebrarum, atque extremitatum tumor, trocisci de raue<sup>9</sup> Seni cum syrupo acetoso de melle in potu dādi sunt: qui & masticeis, succi eupatorii, succi absinthij, seminis foeniculi, anisi, omnium ana drachmas duas, raue<sup>9</sup> Seni drachmas decē, informētur trocisci pondere aurei vnius, ex quibus vnus in potu omni die tribuatur. Sumātur præterea spica, mastix, ciperū, squinātū, calam<sup>9</sup> aromaticus, crocus, myrrha: deinde myrrha & mastix i vino dissoluta cū alijs misceātur, & ex eis emplastrū epati superponat. Ager verò à cibis grossis & frigidis abstineat. Si autē hæc non suffecerint, trocisci de lacca cū apozimate de radicibus sunt dādi. Trocisci autē de lacca sunt q & lacce, raue<sup>9</sup> Seni, amborū ana drachmas tres, spicæ, seminis apij, ameos, masticeis, squināti, seminis iuniperi, amigdalatū amararū, costi amari, rubeę tinctorū, succi eupatorii, asari, aristologiæ rotundę, gētianæ, omniū ana drachmā vnā semis. Informētur ex his trocisci pondere vnius aurei. Apozima de radicibus & corticū radicum apij, foeniculi, amborū ana drachmas decē, seminis apij, seminis foeniculi, floris squināti, ameos, oim ana drachmas quinque, rosarū rubearū, spice odorifere, amborū ana drachmas tres, coquant in libra vna aquę donec ad tertiā redeāt, & det in potu cū prædictis trociscis. Si autē apostema

ta in epate fiāt; eorū cura erit vt apostematum quæ in stomacho generantur.

De Ictericia.

Cap. L X V I I I.

**S**I cum ictēricia fuerit febris, succus endiuiae, & solatri, & aqua hordei ægro in potu tribuatur. Ipse quoque ex cucurbita & chrysolocanna, & citrullis, & his similibus herbis frigiditati attinentibus nutriendus est, & syrupū acetosum ex fortissimo aceto in potu sumat. Epate præterea emplastrū ex duobus sandalis est superponendum, & venter ex succo prunorum, & zuccaro soluendus. Quæ si non suffecerint, trocisci de camphora cum succo granatorum dādi sunt. Trocisci de camphora, & zucari, spodij, rosarum rubearū, omnium ana drachmas tres, seminis endiuiae, seminis citrullorū, seminis cucurbitæ, seminis lactucæ, seminis portulacæ, sandali rubei, omnium ana drachmā vnā. Informentur ex his trocisci pondere drachmarū duarū, ex quib⁹ quotidie vnus cū sexta drachmæ vnus de camphora detur. Si autē æger venas habuerit plenas, fueritq; diu ex quo minutus non fuit, phlebotometur. Quod si ictēricia fuerit sine febre, venter ex his pilulis solvatur, quæ & aloës drachmā vnā, scamoneæ quartā drachmæ vnus, agarici partes duas drachmæ vnus, succi eupatorii tertiā drachmæ vnus, ex his cum succo endiuiae confectis, fiant pilulæ & sufficient ad dosim vnā. Deinde dentur trocisci de laeca cum apozimate de radicibus. Si autem ictēricia in oculis remanserit, æger fortissimum acetum paulatim olfaciat, & balneum ingredietur. Eius quoq; oculis, qui ictēriciam cum febre

patitur, aqua rosata immittenda est. Ictericæ præterea valde confert, vt æger per tres hebdomadas serum bibat.

De hydropisi. Cap. L X I X.

**C**Um vëter post epatis dolorem & febres augmētari cœperit, & quod est ab vmbilico vsq; ad femur exterius pminuērit, & cūtis quæ ibi est, subtiliari, & albere visa fuerit, & cū vëter mouetur, audit sonus quasi aquæ in vase nō pleno motę, & si cū his vrina fuerit rubea, parua habenda est fiducia: & propriè si virtutis non affuerit fortitudo. His tamen si virtus fuerit fortis, & venter vehementer siccus, pilule de raueđ Seni quæ recipiunt mezereon, sunt dā dā. Pilulæ autē de raueđ sunt quæ ꝑ. raueđ Seni, succi eupatorij, seminis endiuie, omniū ana drachmas tres, agarici drachmas quinç, mezereon drachmas decē, fiant ex his pilulæ, quarū dosis sit drachmę duę & semis: ex quibus quaq; hebdomada dosis vna sumatur. Quod si virtus debilis fuerit, trocisci de mezereon sunt dandi, qui ꝑ. seminis endiuie drachmas decē, mezereō, drachmā vnā & duas tertias, agarici, succi eupatorij, similiter tantundē, rosarū, seminis citrullorum, amborū ana drachmas duas semis. Ex his omnibus fiāt trocisci decem, de quibus vnus in die cum syrupo acetoso de zuccaro dandus est. Si autem venter fuerit solutus, dentur trocisci de berberis cum syrupo acetoso. Æget quoque nutriatur ex zibabegi, & bibat syrupum acetosum de citonijs. Et si ventris solutio vehemens fuerit, citoniorum rob solum dandum est. Si autem cum hac passione non fuerit vrina rubea,

neque calor, pilulæ istæ dandæ sunt, quæ & mezereon, serapini, amborum ana drachmam semis, salis indi, fimi columbini, amborum ana sextam drachmæ vnius. Pilulæ enim istæ aquâ vehementer expellunt, & descendere faciunt. Trocisci præterea de lacca cum apozimate de radicibus dandi sunt. Emplastrum ascliti conueniens, & farinae hordei, ciperi, stercoris ouini veteris, baurach, boli armeni, omnium ana partes æquales. Ex his omnibus tritis fiat emplastrum super ventrem. Huius nanque proprietas est, aquâ magnam partem exiccare. Quod si in palpebris & extremitatib<sup>9</sup> fuerit apostema molle, & testiculi apostementur, facies quoque ac totum corpus mollitie quadam teneantur, erit tunc hydropisis species quæ hyposarca nominatur. Ægro itaque hac laboranti, trocisci de lacca cum apozimate de radicibus sunt tribuendi, & venter quaque hebdomada ex pilulis de reubarbaro est soluendus, & patiens in arena calida sepeliendus. Ei præterea est præcipiendum, vt exercitio vtatur, & famem ac sitim sæpe patiatur. Si verò venter inflatus ac tensus fuerit, & cum percutitur, sonum reddit vt tympanum, hydropisis species adesse significabitur, quæ tympanites dicitur. Quam qui patitur, à comestione olerum abstinere debet, atque eorum omnium quæ ventositatis sunt generatiua. Venter quoque omni die ex panico est vaporandus, & ventosæ super ventrem ponendæ, & medicamina tumore dissoluentia dāda sunt, vt dyaciminum, electuarium de baccis lauri, quod in capitulo de iliaca nominabimus. Æger præterea

exercitio vti assuescat, & famē pati, & ex collyrijs quæ ventositatē dissoluunt, quorū faciemus mentionem, sibi subijciat. Venter quoq; cū mātili, donēc incipiat rubere, fricetur, & ex oleo rutaceo clysterizetur.

De dolore splenis. Cap. L X X.

**S**I cum dolore splenis fuerit calor, & vrinę rubedo, & febris, æger ex his trociscis sumat. Trocisci de agno casto ꝛ. seminis agni casti, seminis tamarisci, amborum ana drachmas decē, seminis endiuie, seminis portulacę, amboꝝ ana drachmas quicq;. Ex his fiāt trocisci, de qb<sup>9</sup> quotidie def vnus cū syrupo acetoso de zuccaro, cui<sup>9</sup> pōd<sup>9</sup> sit drachmarū triū. Æger verò si replet<sup>9</sup> fuerit, ex saluatella q̄ est in sinistra manu phlebotomet. Splen quoq; ex frusto filtri aceto calido ifusi, embrocet: & obseruet a reb<sup>9</sup> dulcibus & cibis grossis. Quod si cū prædicta ægritudine nō fuerit calor, ægro trocisci de caparis dādi sunt, qui ꝛ. corticis radicū capparis, seminis agni casti, amborū ana drachmas decē, scolopēdrię drachmas septē, aristologię lōgę, foliorū rutę, seminis nasturtij, aconi, nigellę, ōniū ana drachmas tres, armoniaci drachmas tres. Armoniacū in aceto dissoluat, ex quo cætera cōficiātur, & informentur ex eis trocisci pōderātes drachmas duas, ex qbus vn<sup>9</sup> cū syrupo acetoso de melle, & apozimate de radicib<sup>9</sup> in potu sumat. Si autē splen tēsus fuerit, & cū premit, auditur sub eo rugitus, ex prædictis trociscis cum apozimate de radicibus est dandum, & vinum vetus bibendū, & potus aquę minoretur, quātū plus possibile fuerit. Emplastrum ad duritiem

& ventositatem quæ est sub splene, & foliorum rutæ drachmas decem, baurach, mentastri sicci, amborū ana drachmas tres, armoniaci drachmas septem. armoniacum in veteri vino dissoluatur, ex quo cætera conficiantur, & fiat ex eis emplastrum, quod loco superponatur.

De passione colica, & iliaca. Cap. LXXI.

**S**I cum dolore ventris fuerit ipsius constrictionio & nausea, sed nec calor nec febris affuerit, ea ægro danda sunt, quæ ventrem sine vomendi desiderio soluant, ut est electuariū de gallia, quod & masticis, garyophylorū, zinziberis, melanopiperis, macropiperis, cynamomi, nucis muscatæ, galliæ muscatæ, omnium ana drachmas decem, scamoneæ drachmas decem. postea exprimantur citonia acetosa & recentia, & succus eorum cum eiusdem quantitatis melle misceatur & coquatur usque ad spissitudinem paulatim, & conficiatur ex eo medicamen, quod tamen eiusdem sit quantitatis cuius species sunt, cuius dosis sit à duabus drachmis usque ad duas & semis. Quod si nausæe vehementia non fuerit, neque eger medicinas vomuerit, pilulæ iliacæ sunt dandæ, quæ & colocynthidæ, serapini, amborum ana drachmas decem, scamoneæ drachmas tres, & tertiam drachmæ unius. Informentur pilulæ, de quibus unius aurei pondus est dandum. Velociter enim passionem dissoluunt iliacam. Si autem passio iliaca difficilis fuerit, neque medicamina ventris solutiva ei contulerint, hoc suppose collyrium, quod & salis panis drachmas decem, colocynthide interioris, scamoneæ, amborū ana drachmas duas



femis. fiant ex eis collyria lōga & supponātur. Et si non cōtulerit, ex enemate leui clysterizet, quod, & sic<sup>9</sup> citrinas quinq, furfuris quātū vna manu capi potest, maluaufci manipulū vnū. hæc in pāno ligato, & siclæ folia decē in duab<sup>9</sup> libris aquæ coquātur, donec ad vnā redeant, deinde coletur & ponatur sup eā baurach pondus vni<sup>9</sup> aurei, olei sisaminivncia vna & fiat clystere ex eo. Si quis autē forti<sup>9</sup> & acutius facere voluerit, pōdus aurei vnus de collyrio quod prius diximus, admisceat. Clystere vehemēter soluēs, quo tūc vtēdū est cū medicamina non cōferūt, neq; venter soluitur, & coliquintidæ interioris drachmas decem, centaureæ drachmas quinq, buchormariē, arthanitæ, āborū ana drachmas duas, mentastri, rutæ, origani, omniū ana manipulū vnum. omnia in tribus libris aquæ, donec ad duas tertias libræ vnus redeant, coquātur & colentur. deinde dissoluātur in ea alchitran, mel lis, amborum ana drachmæ tres, castorei, serapini, opopanaci, collyrij quod prædiximus, omnium ana drachmæ duæ: misceantur omnia, & dum est tepidum, fiat ex eo enema: & si squiballæ non exierint, iteretur clystere, donec exire videantur. Hoc nanq; clystere administrari debet cum res fortissima est & pessima, & in colica mala: & est illa in qua fit nausea valde vehemens, & inferius nihil egreditur. Huic præterea ægritudini quandoq; foetida superuenit eructatio, & plerunque stercus per os egreditur: quod cum accidit, sæpe mortem portendit. Quod si cum ventris dolore non fuerit ipsius strīctura, sed inflatio & rugitus ac tensio in ventre exi-

stunt, confectio de baccis lauri danda est. & foliorum rutę siccorum drachmas decem, ameos, cimini, nigellę, cheisin, origani, carui Alexandrini, seminis amigdalorum amararum, melasnopiperis, macropiperis, mentastri, dauci, acoxi, baccarum lauri, castorei, omnium ana drachmas duas, serapini drachmas quatuor, opopanaxi drachmas tres. conficiantur cū melle eiusdem ponderis, cuius dosis sit vt. auellana vna, aut nabaccha multis vicibus, cū yncia vna vini calefacti, aut cū apozimate de radicibus. Huic enī cōfectioni in remouēda vētositate & dissoluēda, nihil æquiparāt. Hoc præterea supposito-riū subijciat, quod est vētositatis dissolutiuū. & cimini, foliorū rutę viridis, amborū ana manipulū vnū, buchormiarię, arthanitę, amborū ana drachmas tres, baurach drachmā vnā. cōficiantur ex melle: & supponatur cū spōgia vel lana. Hoc enī dissoluit ventositatē, & inferius expellit. Vēter quoq; assiduē ex pāno calido vaporā-  
 dus est, & æger in tinā mittēdus. Si autē hęc nō suffecerint, vētosa cū igne ponenda est, & locus donec rubere incipiat, fricād<sup>9</sup>. Post hoc vnctio-  
 nē fieri cōuenit ex oleo rutaceo, & ex alijs oleis calidis & ex eis clysterizād<sup>9</sup> est æger, postq̃ eis admixta fuerit, castorei, euphorbij, amborū ana drachma semis. Hanc verò solitus pati egritu-  
 dinem, dum sanus est, caueat ne vinum aqua mixtum bibat, nec etiam sumat vinum nisi pu-  
 rum & forte: nec aquam multam bibat, & absti-  
 neat ab herbis & lacte, & omnibus inflatiuis. Philonium faciens Iliosia cum maximo coar-  
 ctatur dolore, & timetur ne syncopis ægro su-

perueniat, ventositatem carminat, & somnum  
 prouocat. & piperis, ameos, foliorum rutæ, mē-  
 tatri, castorei, baccarum lauri, cimini, omnium  
 ana vnciam vnam, opij, mandragoræ, feminis  
 iusquiami, omnium ana vnciam semis. cōficiā-  
 tur cum melle eiusdem quantitatis: detur ex eo  
 pondus vnius aurei. Huic quoq; electuario ad-  
 ditur plerunq; scamoneæ vnciæ vni<sup>9</sup> tertia pars  
 & fit tunc medicamen ventris solutiuum. Si  
 autem cum dolore etiā febris affuerit, cassia  
 fistula in succa endiuie bullito & despumato  
 dissoluta egro est danda, & syrupus violatus in  
 potu est tribuendus, & nutriendus est ex taphea  
 cum oleo de amigdalibus dulcibus condita, & ex  
 leni clysterio clysterizandus. Cum autem loc<sup>9</sup>  
 doloris in ventre apparuerit grossus, & aposte-  
 ma habens, æger in principio phlebotometur, de-  
 inde cassia fistula cum succo herbarū sæpe dā-  
 da est. Et sit cibus eius, cui hic dolor ex consue-  
 tudine accidere solet, taphea vinctuosa cū zuc-  
 caro, & cum oleo sisamino, & abstineat à reb<sup>9</sup>  
 stipticis & acetosis, à cibis grossis & ventrem  
 stringentibus. Qui autem cum hoc dolore vē-  
 tositatem pati solitus est, cibetur cum calagie  
 & mutagenat conditis cum seminib<sup>9</sup>, & absti-  
 neat ab oleribus & lacte, & ab omnib<sup>9</sup> quæ in-  
 flant. Et bibat vinum forte, & non vitiatū. Aut  
 hydromel cum speciebus quæ pro condimēto  
 ponuntur, vt piper, quas dicemus. Hydromellis  
 confectio, & mellis mundi libram vnam, aquæ  
 libras sex: misceantur & coquantur diu, & spu-  
 mentur bene donec fiat ad \* spissitudinem iu-  
 leb. Cūq; hoc factum fuerit, in vnaquaque li-

\* Aliās  
 similitu-  
 dinem.

bra ex eo mittatur drachmę duę piperis puluerizati in panno ligati, donec appropinquet finis decoctioni eius: & cum infrigidatur, extrahatur pannus & exprimatur, & cū necesse fuerit, propinetur. Confert etiam cui hęc passio ex ventositate & grossa superfluitate accidere solet, oleum de cherua recenti cum apozimate de seminibus sumptum. Apozima autem de seminibus est hoc, & ameos, cimini, cheisim, carui, origani, nigellę, omniū ana pugillum vnum, istis admisceantur aquę librę tres, & coquantur donec redeant ad libram vnā & mediam. De hoc itaque apozimate sumantur vncię duę, quibus drachmę tres olei de cherua addantur, & multis diebus bibantur. Sed si cui dolor iste cum calore superuenerit, prunę viginti, & ficus citrinę quinq; & passarum enucleatarum drachmę quinq; sumantur, & coquantur & colentur, deinde cassia fistula in eo dissoluta coletur, cui oleum amigdalinum admisceatur, & sumatur: & ex apozimate, quod in capitulo de rheumatismo diximus, in potu tribuatur. Venter verò si multum fuerit siccus, prædicto apozimati addantur polipodij, turbith, amborum ana drachmę duę, & coquantur cum eo, & detur donec venter solvatur, cum autem solutus fuerit, remoueatur polipodium & turbith. Electuariū quod ventrem soluens, inflationem resoluit & grauedinem, & turbith albi fricati & puluerizati drachmas viginti, zuccari drachmas triginta, zinziberis drachmas decem. huius pulueris drachmę tres ad bibendum dentur. Pilulę de quibus cum quis ventrem soluere voluerit,

vnā sumere debet, quę appetitū excitāt, & inflationē reprimūt & grauedinē, & cibū digerūt, & masticeis, zinziberis, cinamomi, garyophyllorum, neheremisch, melanopiperis, macropiperis, scamoneæ, zuccari, violarum, omnium ana vnciam vnā. fiant ex eis pilulæ ad magnitudinem ciceris, & sumatur vna, mouebit enim semel aut bis.

De fluxu ventris.

Cap. LXXII.

**C**um cibus in stomacho more solito non moratur, imò citius egreditur non mutatus nisi parum, & fuerit cum hoc mordicatio, & dolor in ventre & sitis, cum quo etiam plerūq; adest ventris fluxus, in quo ante comestitionē inuenitur aliquid purulentū, detur ægro rob de succo vix acerbę, aut de succo ribes, aut de succo granatorum cum spodij, & rosarum, amborum ana drachma vnā. Trocisci quoque de spodio constrictiui itidem tribuātur. Nutriatur autem ex adesia citrina, & pullis cum acetato coctis, & aflatis, & in succo vix acerbę positis. In potu verò sumat sumach cum aqua rosata, & deinde nutriatur ex cibo, cui admisceatur sumach qui vocatur sumachia. Totūque eius regimen ad hoc perducatur, vt infrigidare possit & constringere. Quòd si non fuerit cum eo mordicatio in ventre, neque quod egreditur pus habet admixtum, sed est viscosum, & adest inflammationis paucitas, & pauca sitis & ructus acidus: ægro ficla & sinapis & pisces saliti tribuantur. Deinde cogatur ea vomere, sumendo salem & mel & anetum coctum.

Quæ si non suffecerint, medicamen quod expellet phlegma tribuatur, quod ℞. aloës drachmā vnam, coloquintidæ interioris drachmas quatuor, salis indi drachmas quatuor, turbith drachmam vnam. Ex his fiant pilulæ, & sufficiunt ad dosim vnam. Vomitu præterea sæpe vtatur, & cibaria quibus vtitur, in almuſi per se intingantur: & comedat fulcida quæ sale condiuntur, & quæ acrimoniam habent, quæ appetitum prouocare consueuerunt. Si autem cum hoc quod diximus nihil egreditur quod sit superfluum, neque quod expellitur aliquid purulentum, vel phlegmaticum habet admixtum, egro vinum purum, & forte tribuendum est, & dyaolibanum dandum, quod ℞. olibani drachmas decem, piperis, ameos, spicæ, cheisin, anisi, nigellæ omnium ana drachmas duas, balaustiæ drachmas decē, mellis despumati quod sufficit ad conficiendum. Detur ex hoc in potu, quia stomachum calefacit & vehementer desiccatur. Apozima quoque de feminibus quod in capitulo colicæ passionis nominauimus, detur: & assuescat in potu sumere vinum purum. Si verò cibus non egreditur, sed res subtiles & alba & aquosa, cum qua sunt, ea quæ epatis significant debilitatē, ægro tribuatur id quod fit de scoria, & dyaolibanum, & trocisci calefacientes epar, quos nominauimus, & electuarium dyacalamentum, quod ℞. foliorum rutæ foliorū calamenti siccorū, ameos, carui, leuistici, zinziberis, cinamomi, macropiperis, omniū partes æquales, cōficiat cū melle cocto. Et dentur alia medicamina quæ nominauim⁹ in capitulo epatis, ex his quæ

ipsum calefaciūt & confortant. Si autē cū prædicta ægritudine non fuerit. significatio debilitatis epatis, imò quod egreditur cū fluxu subtile est & album: & fuerit in stomacho grauitas, puluis de malis granatis ad transglutiendū dandus est, qui, &. ossiū granatorum acetosorū assatorum, & tritorum vt alcohol drachmas centum, carui, seminis coriandri, amborum aceto acerrimo infusorū & postea assatorū ana drachmas viginti, xilocaractæ, sumach, balauſtiæ, omniū ana drachmas decem. puluerizētur optime & commisce: & detur ex eis puluis ad transglutiendum. Electuariū quoq; quod dicitur cazi, detur, quod &. arillorū passarum tritorū vt alcohol librā vnā, myrtillorum siccorum puluerizatorum vt alcohol libras quinque. xilocaractæ, Nabati, balauſtiæ, seminis tamarisci, ameos, omnium ana drachmas decem. conficiantur cū melle de canna, aut cū melle apum optime despumato, & ex electuario sumatur. Si autem quod egreditur citrinum fuerit, & anum mordicat, & æger sitim patiatur, & febrem, trocisci constrictiui de spodio, & aqua sauich hordei dētur. Trocisci constrictiui de spodio, &. rosarū rubearum, spodij, amborū ana drachmas decem, seminis acetosæ, sumach, balauſtiæ, gūmi arabici, omniū ana drachmas quinque. Informentur trocisci pōdere drachmarum duarū. quorū yn<sup>9</sup> cum vncia vna rob. citoniorum simplici sumatur. Aqua vero sauich hordei, quā diximus, ita fit: Hordeum fractū in aqua ipsum cooperiente bulliat donec aqua inspissetur, deinde coletur & bibantur ex ea vnciæ quatuor, cum dra-

chmis tribus spodij, & gūmi Arabici eadē quā-  
titate. Quòd si ex fluxu ventris euenerit excō-  
riatio, puluis de bolo armeno ad transglutiendū  
detur, qui ℞. psyllij drachmas viginti, seminis  
plantaginis drachmas decem; gummi arabici,  
boli armeni, amborū ana drachmas tres. psyl-  
lium affetur, & gummi & bolus, puluerizentur  
& commisceantur, & sumātur in potu ex eo in  
mane drachmæ tres, cum rob de citonijs, & cir-  
ca noctem tantundem. Cibus verò eius sit pul-  
mentum factum cum granis granatorū, & pas-  
sis cum aqua & aceto, & cibus factus cum fue-  
co vuæ acerbæ & sumachia & taphea, cui ad-  
miscetur succus sumach & his similia cibaria.  
Trocisci quoq; de balaustijs quī cōtinue confe-  
runt diarriæ, dandi sunt, cū fluxus fuerit super-  
fluus siue habeat sanguinē admixtū, siue nō. ℞,  
gallarū, siliquarū, Nabati, seminis tamarisci, oli-  
bani, balaustiae, omniū partes æquales, opij, gū-  
mi arabici, amborum ana partem mediam. In-  
formētur trocisci pondere drachmarū duarum,  
ex quibus vnus cum vino sumatur, si neque ca-  
lor affuerit, neque febris. Sed si febris affuerit  
cum rob de citonijs acetosis sumatur, qui tunc  
dandi sunt, cū ventris fluxus superfluus fuerit.  
Trocisci ad tenasmū, qui tunc dandi sunt, cum  
caloris absentia fuerit, & vētositas erit nociua,  
& sonitus, ℞. seminis iusquiami albi, seminis a-  
neti, seminis foeniculi, ana drachmas quinque, a-  
meos drachmas duas semis, opij drachmas tres,  
seminis apij drachmas decē. fiāt trocisci, de qui-  
bus pondus vnius aurei in potu sumatur. Con-  
fectio electuarij de stōracē quē antiquo ventris  
f. j.



fluxui cōfert ac tenasmo, cum neq; febris neq; calor affuerit, sed aderit ventositas nociua, danda erit. ꝛ. castorei, opij, asari, storacis liquidæ, myrrhæ, seminis iusquiami nigri, thuris, omniū partes æquales, mellis quod sufficit ad specierū confectionē, cuius dosis sit ā drachmis duabus vsque ad tres. Si autem postquam tenasm<sup>9</sup> decem transierit dies, non visa fuerint medicamina conferre, & æger supra pectinem sentit dolorem, redeundum est ad clysterium, quod ꝛ. panici excorticati, rizi excorticati, lētiū excorticatarū, rosarum siccarum, balaustieg, cupularū glādiū, omniū ana manipulū vnū. omnia in tribus libris aquæ coquātur, donec ad librā vnā & mediā redeant, & colētur, deinde sumātur cerussæ, cineris papyri babylonici, aut cineris papyri, amborū ana drachma vna, boli armeni drachma semis, vitellus oui vnus affatus durus, olei rosati vncia semis, ex his omnib<sup>9</sup> in prædicto apozimate fricādo dissolutis, clysterizetur æger semel aut bis. Q<sup>z</sup> si tenasmus fuerit longi tēporis, in quo nō egreditur sanguis, sed rasura alba muscilagini similis, medicamē putredinis, quod in capitulo de cura gingiuarū putridarū nominauimus, dādum est, ex quo in apozimate eorū quod nominauim<sup>9</sup>, fricato & dissoluto clystere semel aut bis fiat. Et si ex vētris fluxu i vētre vehemēs mordicatio secuta fuerit, clystere fiat ex oleo rosato tepido. Si autē nullo modo mordicat, clysterio ex illo medicamine multoties addat, donec sanet. Epithima quo venter cū flux<sup>9</sup> vehemēs est, & virtus debilitata, liniēdus est, ꝛ. galliæ, acaciæ, ciperi, myrrhæ, gallarum, cypressi,

thuris, omniū partes equales. Ex his omnib<sup>9</sup> vino veteri aut succo citoniorū cōspersis liniatur vēter. Huic quoq; quādoq; addit panis bis coct<sup>9</sup> de Syria. Si autē cū hac egritudine fuerit calor, epithima fieri cōuenit ex duob<sup>9</sup> sandalis, & rosis, & bolo armeno, & faufel, & galla & pane bis cocto cū succo macianorū aut citoniorum, aut myrtino. Quā si æger vehementer patiat<sup>r</sup> tenasmū, & sepe vadat ad sellā, & tamē nihil egrediat<sup>r</sup>, collyriū istud subiiciat<sup>r</sup>. Est enī mirabile ad sedandū tenasmū, qđ ꝑ. thuris, licij, croci, gūmi arabici, ōniū ana drachmā vnā, opij drachmas duas. Informentur collyria & supponantur.

De difficultate mingendi. Cap LXXIII.

**C**um vrina minuit<sup>r</sup>, aut ex toto retinetur, neq; in femore apparet tumor, neq; grauitas neq; dolor in renib<sup>9</sup> sentit<sup>r</sup>, succurrendū est ex medicaminibus vrinæ ꝑuocatiuis, quę nominabim<sup>9</sup>. Vnū quorū est hoc, quod ꝑ. feminis apij, nitri, rubeę tinctorū, olixatri, seminis iuniperi, feminis asari, ameos, feminis foeniculi, spice, amygdalarū amaranū ana drachmas viginti, feminis melonis drachmas decē, cātariadū quarū capita & alę abscissa fuerit, drachmā vnā, armoniaci drachmas tres. Armoniacū in vino dissoluat<sup>r</sup>, & alię species ex eo cōficiātur. Ex quib<sup>9</sup> fiāt formę auellanis similes, de quibus sumātur ab vna drachma vsq; ad tres drachmas. Hoc enim medicamen valde confert corpori, cum dissolutionē patitur, & laxitatē, & hypofarcæ, & ad expellenda omnia accidentia, causa quorū corpus desiccari oportet. Quod si cōtingat mingendi difficultas ex casu aut per

cussione in femore, aut in ano, aut in eorū circuitu, eger ex basilica minuatur, deinde aqua calida loco sæpe superfundatur, & vsq; ad spatium medijs diei ex oleis fricetur. Aegro quoq; præcipiatur vt vrinam expellere nitatur. Si autē mingendi difficultas contingat, vesica existēte plena & extensa, & sit hoc post sanguinis aut saniei mictum, medicamina quæ trumbos sanguinis, aut pus quod in vesica generatur, soluere consueuerunt, & eliquare, danda sunt. Medicamen quod trumbos sanguinis aut saniei quæ in vesica sit, dissoluit, & cordumeni, myrrhæ, rubæ de qua tingitur, seminis iuniperi, armoniaci, assæ foetidæ, omniū ana partes æquales. Armoniacum dissoluatur, & informentur pilulæ ex alijs speciebus cum eo conspersis. De quib⁹ quater in die sumatur cum apozimate de seminibus quod nominauimus. Syrupus etiam acetosus ex forti aceto factus, multoties detur. Per siringam præterea immittatur in vesicam aqua in qua dissolutus fuerit sal, aut aqua cineris. Et ista est confectio aquæ quæ fit de cinere, & cinerem de \* Illice, cinerem de vitibus, cali, calcem, his omnibus admisceatur tantum aquæ vt ex ea cooperiri possint, & dimittantur sic per tres dies. deinde colētur, & per siringā in vesicā iniiciantur. Herba quoq; croci hortulani & sulla cocta superponatur. Tinam præterea assidue ingrediat, in qua sit aqua, in qua cocta sint camomilla, sticados arabicus, sansucus, sisimbrium, aut in qua extremitates caulium, & sulla, & fim⁹ colubinus cocta fuerint: & æger in decoctione eorum sedeat quādiu poterit, & ex herbis istis

\* Aliàs  
glādib⁹.

sic coctis fiat emplastrum super femur & partes ei circūadiacētes. Et dum in tina moratur, sumat ea in potu quæ vrinæ prouocatiua existūt. Et si hæc omnia non profuerint, ad instrumentum quo vrina prouocatur, recurrendū est. Si autem mingendi difficultas post lapidis signa affuerit, æger supinus iaceat, & pedes eius diu & diuersis modis & fortiter quatiendi sūt. Et si vrina non egressa fuerit, oportebit vt cum instrumento curetur, per quod membro immisum sit impulsio. Cauendum tamen est, ne virgæ immittatur cum est ibi apostema. Ad difficultatem quoque vrinæ valde confert sæpe ingredi tinam, & vngere locum ex oleis, & medicamina vrinam prouocantia in potu sumere, & abstinere à nutrientibus acetosis, & ponticis & grossis.

De lapide renum & vesicæ. Cap. LXXIII.

**C**Um æger virgā sæpe fricat & manu tractat, ipsa quoque frequēter erigit, & \* are \* Alias  
scit, & vrina difficulter & cū dolore egreditur, in qua ægritudine fortasse etiam longa  
subtiliat  
non quandoque exit, lapis in vesica esse significatur. Si autem æger cum difficultate mingendi sentit vehementem dolorem in renibus, & in  
\* emunctorijs, & nauseam & ventris constrictionem, in renibus lapis esse monstratur. \* Alias  
Lapis inguinibus.  
di verò qui est in vesica confectio hæc utilis existit, & est optima ad frangendum lapidem, etiā cum fuerit vetustus. Ego quoque iam fregi cū eo magnum lapidem in spatio minore quadraginta dierum. Cuius confectio ꝑ. carpobalsami, seminis raphani, dauci, feminis olixatri, corticis  
f. iij.

radicum opopanaxi, corticis radicum capparis, amygdalarum amararum, dānocochiæ, squināti, ciperi, spicæ indæ, cassiæ lignæ, sacholocondrion, harmel, gētianæ, aristologiæ rotundæ, asari, cordumeni, armoniaci, serapini, bdellij, piperis, acori, omniū ana partes æquales. Gummiæ sufficienti balsamo dissolutæ malaxentur, & ex eis aliæ species conficiantur. ex quibus informētur pilule, & sumatur ex eis in die vna drachmā cum apozimate de seminibus. Quandoq; etiam sexta pars drachmæ vnius de cinere scorpionū simul cum eis datur. Cinis verò de scorpionib⁹ hoc modo fit, Scorpiones fumantur, & in ollam nouam positi os habentem oppilatum super latereculum in furnū mittantur, in quo non sit vehemens calor, & sint ibi sex horarum spatio, deinde extracti puluerizentur, & reponantur. Aeger verò nutriatur ex aqua ciceris & calagię & mutagenat. Et abstineat a lacte & caseo, & ab alijs cibis grossis. Ingrediatur tinam in qua sit aqua in qua cocta sint folia caulium & sulle & berengelif, & mentastrum, & finus columbinus, & medulla seminis croci hortulani. Femur etiam inungatur ex oleo de scorpionibus, & distilletur etiam ex eo in virgam. Oleum de scorpionibus, quod & aristologię rotundæ, gentianæ, ciperi, corticis radicum capparis ana vnciam vnā. Hęc omnia in libra vna olei de amygdalis amaris posita ad solem per hebdomadā vnā dimittantur, & colentur, & ex primatur, & pro vnaquaq; libra ex eo adiungatur ei scorpiones decē, & totū in vase, cuius os oppilatū sit, missum ad solē per duas septimanas moretur,

deinde coletur & reponatur. Est enim optimum & mirabile, de quo quotidie in virgā guttatim fundendū est, postq̄ æger de tina egreditur. Quod si lapis magnus fuerit, nō inuenitur aliud remedium, nisi vt cū incisione extrahatur. de hoc tamē loqui nostri libri huius modū excedit. Cū autē in renibus fuerit lapis, æger frequēter tinā ingrediatur, & renes & ilia ex oleis inungātur, & ea quæ locum calefaciunt, desuper cū panno ponantur, vt sunt ea quæ nominauimus. In portu quoq; sumātur ea quæ lapidem frangunt. Si autem lapis ceciderit, & in virga obstaculū fecerit, aqua calida ab alto distillādo ei superfundatur, donec rubere videatur, deinde oleum tepidū guttatim superiniiciatur, & fricetur: & si necesse fuerit, ad exteriora fugat. Ex hoc enim mouebitur lapis, & exibat. Sed si magnus fuerit & angulosus, necesse est vt virga inferius incidatur, & extrahatur.

## De apostematibus renum &amp; vesicæ.

## Caput LXXV.

**A** Postema quod fit in renibus, & in vesica cōcomitatur febris permixta, quæ nō est vehemētis caloris, cum qua est horripilatio & rigor & frequens mictus, & dolor \* in inferioribus dorsi & grauitas, & cū impellitur, videtur ægro q̄ aliquid ibi suspensum sit. Cū hæc itaq; signa uisa fuerint, æger ex basilica phlebotomei ei⁹ partis in qua dolorē sentit & grauedinē. Loco quoq; emplastra in frigidatā supponantur: & si egritudo sic dissoluta fuerit, bonum erit. Si autem febris, & dolor, & grauitas perfectauerint, & vrina minutim, & frequēter egres-

\* Aliās  
sub.

ditur, significatur pus ibi colligi. Est igitur tunc super dorsum emplastrum ex camomilla, semine lini, furfure, oleo sisamino conspersis ponendum, & ægro vt in tina sedeat præcipiendum. Si autem æger minxerit pus, semina quæ nominabimus in capitulo de ardore vrinæ, sunt danda, donec pus minuat: deinde dentur trocisci, quos in capitulo de mictu sanguinis & saniei nominabimus. Apostema verò quod in vesica fit, deberet concomitari febris conclusa, & difficultas mingendi, & dysuria, & femoris, & virgæ dolor, & tunc æger ex basilica phlebotomandus est: & fiat ægritudinis cura, quæadmodum prædiximus. Est autem quandoque renū apostema quod non peruenit ad saniem, imò transit in duritiem, cuius grauitas in renibus sine febre perseverat. Est ergo clysterizandus ex muscilagine foenugræci, & seminis lini, & apozimate camomillæ, & caulium, & meliloti, & maluauiſci, ac fursuris, & vomat frequenter. Renibus quoque superponatur emplastrum ex eis quæ nominauimus. Et si vrina minui videtur, cum illo vrinam prouocantia dentur. Hoc quoque pro paruo non est habendum, quia ex eo peruenitur ad hydropisim.

De ardore vrinæ. Cap. LXXV.

**C**um æger, dum mingit, sentit ardorem & punitionem in virga, a falsis & acetosis, & acutis abstinendus est, & nutriendus est ex taphéis lenibus, & zibrebégi, & eorum similibus. Hoc quoque medicamen ei dandum est: Quod recipit seminis melonis excorticati drachmas triginta, seminis citrulli, seminis cucurbite, seminis

portulacę, seminis papaueris albi, omnium ana drachmas tres, seminis iusquiami albi drachmas duas, zuccari albissimi ad pōdus omniū. De puluere horū quotidie in potu drachmę tres in mane, & alię drachmę tres circa noctē, cum vncia vna syrupi violati, aut fuleb sumātur. Hęc quoque ēgritudo non est paruipendenda, quia cum sit mansiua & perseverans, proueniunt ex ea in vesicā, & in instrumentis vrinalibus vlcera.

De mictu sanguinis & saniei.

Caput LXXVII.

**C**VM aliquis propter casum, aut percussionem sanguinem minxerit, ex basilica phlebotometur, & trocisci qui dicuntur trocisci de charabe, in potu tribuantur. Trocisci de charabe. Recipe charabe, gummi tremulę arboris, amborum ana drachmas quinque, balaustrę, hypoquistidos, amborum ana drachmas duas semis, olibani drachmas duas, seminis apij, opij, amborum ana drachmam vnam. Informentur trocisci pondere aurei vnius: ex quibus vnus omni die cum apozimate sumach tribuatur. Ad comedendum verò tribuantur carnes coctę cum sumach, & carnes coctę cum succo vuę acerbę. Abstineat à cibis acutis & falsis. Loco verò percussionis superponatur emplastrum ex bolo armeno, & acacia, & aloë, & licio, confectis cum aceto & aqua. Si autem sanguinis mictus euenerit post comestionem ciborum acutorum, aut potum vini acuti, phlebotometur æger, & trociscos de charabe in potu sumat, & eodem, quod prædiximus, gubernetur regimine. Pus verò si minxerit æger, trocisci isti



dādi sunt, qui & seminis melonis, citrulli, cucurbitæ, omniū absq; corticibus ana drachmas viginti, boli armeni, gūmi arabici, thuris pinguis, sanguinis draconis, omnium ana drachmas decem, opij drachmas tres, seminis apij drachmas duas. informentur trocisci pondere drachmarū duarum, ex quibus omni die vnus cū syrūpi de papauere vncia vna in potu tribuatur. Virgæ quoque ex isto collyrio immittatur. Collyrium de cerusa, & cerusæ, sarcocollæ, olibani, gummi arabici, opij, sanguinis draconis, omnium partes æquales, fiant ex eis collyria, & per siringam fiat prius iniectio hydromellis, & mingat æger, & post eius egressionem fiat iniectio istius collyrij dissoluti in lacte asinæ.

De his qui non possunt retinere vrinam. Caput LXXVIII.

**C**um æger multū vrinę emittit, & ī emissionē ardorē nō sentit, aut mīgit in somno; nec patit̃ siti, neq; corporis extenuationem incurrit, ea quæ vrinam constringunt, danda sunt. Medicamen retinens vrinam, & glādiū drachmā vnā, olibani drachmas triginta, seminis coriandri sicci, gummi arabici, boli armeni, omnium ana drachmas decem. fiat ex eis puluis, de quo in mane drachmæ tres, & circa noctem totidem ad transglutiendum dentur. Quod si cum hac ægritudine sitis fuerit valēdissima, clamosa, & aqua quæ bibitur, cito egreditur, aqua hordei cum psyllio detur: & nutriatur cum succo vixæ acerbæ, & sumach & similibus horum nutrientium, & cum cibo qui fit de simyla hordei, & masal; & rob acetosum.

da ei in potu, & prohibeatur laborare, & cum muliere concumbere. Isti quoque trocisci in potu sumantur, qui ꝑ. spodij drachmas decem, feminis lactuce, feminis portulacę, amborū ana drachmas quindecim, coriandri sicci drachmā vnam, rosarum rubearum, boli armeni, omniū ana drachmas quinq;, balaustię drachmas duas, camphorę drachmā semis. sumantur in potu cum succo granati acetosi. Herbę etiam frigidę terantur, & super renes ponantur. Et caueat sibi a cibis calidis & vino, & ab omnib⁹ quę vrinam prouocāt. Illud autem quod ex magno stolidorum errore prouenit, est, quia dāt in hac ægritudine ægro medicinas calidas, vnde ilico deducunt ipsum ad phthisim.

De lumbricis & vermibus qui nascuntur in ano & in ventre. Cap. LXXIX.

**Q**ui hoc nocumento solitus est lædi, a cibis grossis & vnctuosis sibi cauere debet, & quotidie antequam comedat, summat bucellas aliquas cum sinapi & almuri: hoc enim ipsos generari prohibet. Si verò eos generari cōtingat, nō cōuenit aliud, nisi vt expellantur. Medicamen ascarides expellens, burūgi excorticati, cū valde famelicus est æger, drachmę septem sumantur. Medicamen magnum, expellens lumbricos, ꝑ. burungi excorticati, turbith, feminis, \* nigellę, omnium partes æquales, lupinorum, nasturtij, cambil, omnium ana partē mediam: sumantur ex eo in potu drachmę septem, prius tamē bibat æger lac mox vt mulctum fuerit per tres dies, & deinde quaque die quarta dietet se, & de prædicto medicamine

\* Alias  
nil.

in lacte adhuc calido, vt multum est, dissoluto, & aceto, dū valde famelicus est, bibat. Vermes verò minuti, qui in ano fiunt, pro quibus generatur pruritus in eo, & ideo confricatur anus: expelluntur cum coto quod ex oleo abluto inuolutum immittatur, aut inuolutū oleo de chrysomellis, aut succo mentastri: aut inuoluatur ex parua quantitate aloës, & felle vaccino, & supponatur.

De hemorrhoidibus, & fistulis, & ragadijs, quæ in ano fiunt. *Cap. LXXX.*

**D**Vm sanguis recens sine dolore per inferiorem fluit regionem, interpolato tamen tempore, non est constringendus, nisi patiens debilitetur. A multis enim passionibus exinde liberatur. Si autem ex eo debilitetur, indiget constrictione: ideo troisci de charabe cū succo sumach dentur. In comestione quoque sumat sumachiam, & cibum qui cum succo vuæ acerbæ sit, & his similia, de illis quæ nutriencia sunt. Si verò multum debilitetur, nutriatur cum succo carnis, cui plerunque succus citoniorum & vinum admisceatur. Vinum quoque bibat stipticum, & super epar ponatur emplastrum de spica, quod in capitulo de epate nominauimus. Et si ista non suffecerint, confectio de scoria ferri detur, quæ ꝑ. mirobalanorum indorum, belliricorum, emblicorū, omnium ana drachmas quinque, spicæ, squinanti, cyperi, zinziberis, piperis, ameos, olibani, omnium ana drachmas duas, scorix infusæ in aceto per hebdomadam vnā, & postea torrefactæ drachmas quindecim, conficiantur omnia cum melle de

spumato, quod fuerit coctum cum apozimate emblicorum, sicut in capitulo de melancholia nominauimus, de quo quotidie ad nucis magnitudinem sumatur. Hoc namq; hæmorrhoidarū sanguinem & menstruorum constringit: fluxui quoque vētris longi temporis remedium affert. Si autē in ano oritur aliquid prominens extrā, ex quo magnus prouenerit dolor, nec ab eo fluat aliquid, succus cepæ cum pauca lana, aut fel vaccinum superponatur. Suppositorium quoq; longum de ciclamine subijciatur, quod patiens per totam teneat noctem, & si contingat egredi, reintromittatur, donec scindatur, & egrediasur sanguis. Cum autem dolor vehemētissimus fuerit, & apostema magnum in ano, phlebotometur æger, & emplastrum hoc superponatur: sedat enim hæmorrhoidarum dolorem, cum adest apostema cum eis, quod & melilotum, camomillam: quæ tandiu in aqua coquantur donec dissoluantur, deinde sumatur ex aqua decoctionis earum quantum manu vna teneri potest, vitellus oui assati vnus, croci drachma vna, opij drachmæ duæ, seminis lini triti, foenugraeci, maluauisci, omnium ana manipulus vnus. Conficiantur omnia ex rob in quo bdellij drachmæ tres fuerint dissolutæ, & folia superposita: postquam eorum superficies ex oleo sisamino in quo adeps gallinaceus fuit resolutus, aut anatis inuncta fuerit, more emplastri superponentur dum adhuc tepida sunt. Alia confectio dolorem & apostema sedans. Cepe album optimè coctum teratur, & cum butyro vaccino misceatur, vt mollescat, & tepesactum ano in quo

est apostema, superponatur. hoc enim dolorem  
vehementem sedat. Cum verò in ano ragadias  
habuerit patiens, quæ eum lædunt cum ipsius  
venter siccus est, pilulis de bdellio sæpe utatur,  
quæ recipiunt mirobalanorū nigrorum, che-  
bulorum, amborum ana drachmas decem, sera-  
pini drachmas tres, nasturtij albi drachmas du-  
as, bdellij mollis & pinguis drachmas quindecim,  
dissoluatur bdellium in succo porrorū, &  
ex eo conficiantur alia, & informetur ex eis pi-  
lulæ, & sumatur ex eis frequenter ab vna dra-  
chma, ad quatuor. Locus verò si adustionem pa-  
tiatur, ex vnguento de cerusa inungatur. Si au-  
tem non sentitur in eo adustio, vngatur ex vn-  
guento quod fit ex adipe, qui in gibbo cameli  
inuenitur, & bdellio, quod sic fit, videlicet vn-  
guentum de Sene. & ceræ citrinæ, olei sisamini,  
adipis anatis, medullæ cruris vaccini, adipis qui  
est in gibbo cameli, bdellij, omnium partes æ-  
quales, bdellium prius in muscilagine seminis  
lini dissoluatur, deinde omnia misceantur: hoc  
enim optimum existit. Si autem æger ragadi-  
as in ano habuerit profundas, à quibus foe-  
tens virus fluxerit, medicamen acutum, quod  
in capitulo de vlceribus oculorum descripsi-  
mus, eis supponatur, quod æger per duos pa-  
tiatur dies. Et si in eis aliquid remaneat quod  
resudet, medicamen iterum apponatur, quod  
eiusque fiat, donec locus siccetur, & non resu-  
det. Quòd si ea quæ ibi sunt eminentia extrã  
& pendentia fuerint, in tantum vt arescant &  
nigrescant, butyrum tepidum multoties super-  
ponatur, donec nigredo ab eo remoueatur. Si au

tem resudatio reuersa fuerit, medicamen acutum iterum ibi apponatur. Et si non resudauerit, ex vnguento de cerusa curetur. Est etiam quando eminentes hæmorrhoides extrâ curantur, cauterizando cum ferro. loqui tamē de hoc plus est quàm hui⁹ nostri libri modus requirat. Fistulę verò generantur in ano velociter, quoniam figura eius facit illud esse necessarium. Quę aut penetrantes sunt vtrinq̃ue, aut non penetrantes. Cum autem perforatę sunt vtrinq̃ue, stercus egreditur ex eis & ventositas. Si autem non egreditur stercus neque ventositas, non est penetrans ab vtraque parte. Loqui verò de eius cura perfectè, plus est quàm hic noster liber exspectat. Sed quia homines ferè õnes semper maximum incurrunt errorem in cura huius ægritudinis, vnde & maximum sequitur nocumentum, ideo nos excitabimus eos ad hoc, quod huic ægritudini congruum erit, & ostēdemus qualiter à prædicto errore se custodiant. Et dicim⁹ quòd fistula vtrinq̃ue perforata, cum ab ano remota fuerit, nullo modo ferro est tangenda. Ex incisione enim ferri cōtingit stercus inuoluntariè egredi. Est etiā aliud quare fistula ab vtraq̃ue parte perforata, ferro tãgi non debet. Quia toto tēpore vitę ægri sic permanere poterit, non magnū faciens nocumentū, nec proueniet ex ea aliquid, nisi resudatio & fluxus. Si autē illud quod ab ea fluxerit, acutum fuerit & mordicatum, & foetidum habuerit odorem, culus etiam quantitas quotidie augeatur, erit fistula putrida, & cum herpete est iomeno: cui ex medicamine acuto, & ex eo quod complet omnia, succurren-

dum est, ætequam dilatetur & magnificetur. Cū autem non resudauerit nisi parum, neque eius quātitas quotidie augeatur, neq; magnificetur, neque malus odor ibi augmentatus fuerit, non est in ea aliquid, quod sit timendum, nisi resudatio & fluxus. Quæ medicari potest, donec siccetur, & detumescat, & non resudet per lōgum tempus. Si autem resudatio redierit, medicamē prædictū adhibeatur, & hoc modo poterit blādiri per totum tempus vitæ ægri, & non nocerebit. Modus adhibendi medicamē huic ægritudini: Ex collyrio quod in capitulo de fistula oculi nominauimus, sumatur, & optimè teratur, & fistula prematur, donec, quicquid in ea continetur, egrediatur: & si radius eam ingredi poterit, inuoluatur coto, deinde ex prædicto medicamine, postquam mollificatum fuerit, intinctus in fistulam mittatur. Si verò minime radius in eam ingredi poterit, dissoluatur medicamen in aqua, & subleuetur coxa ægri, supposito puluinarī, & eo supino iacente, prædictum medicamen distillando super fistulam fundatur: & fiat hoc in mane, & circa noctē per tres dies, & sedeat in aqua de curcuma, & lauetur ex ea.

De exitu ani, & matricis. Cap. L X X X I.

**C** Vm anus extra egreditur, apostemate carens, & ita disponitur, quodd si impellatur, ingreditur cerusæ, balaustiarū, gallarum, aluminis, antimonij, omnium partes sumantur æquales, & redigantur in puluerem, & super locum ex oleo roseo calefacto inunctum puluerizentur, & anus intromittatur, & cōstringatur, quod tamen fieri conuenit, postquam æ-

ger à sella reuersus fuerit, ne eum cito surgere ad sellam sit necesse. Sumantur etiam gallæ, balauftiæ, cupulæ glandium, folia myrthi, & coquantur in aqua donec rubea fiat, & sedeat in ea & lauetur ex ea. Quòd si anus qui apostemofus est ingredi minime potest, æger aquam calidam frequenter ingrediatur, & in ea sedeat & vngat anum ex cera & oleo camomillino, aut anetino, donec ingrediatur. Cùmq; intromissus fuerit, ex his quæ nominauimus curetur. Vulua præterea si egressa fuerit, similiter erit medicanda. Est tamen necesse vt fortiter ligetur, & vt ægra semper supina iaceat & coxæ superius eleuentur.

De superfluitate menstruorum constringenda. Cap. LXXXII.

**P**Ro superfluis menstruis constringendis, trocisci de charabe per hebdomadam vnam sunt dandi. Qui si non contulerint, confectio de scoria detur, & fiat minutio ex basilica. Ventosæ quoque ad mamillas apponantur, & in comestione stipticis vtatur cibus. Et hoc medicamē ægra sibi subiiciat, quod recipit olibani, balauftiæ, gallarum, antimonij, acaciæ, aluminis, omnium partes æquales. Puluis horum optimè tritorum, cum pauca lana subiiciatur. Femur verò & dorsum ex epithimatis, quæ in capitulo de fluxu ventris nominauimus, epithimentur, & sedeat in aqua de curcuma. Quòd si ista non contulerint, ex alio pessario acuto fiat immissio, & maneat in vulua.

De retentione menstruorum, & eorum prouocatione. Caput LXXXIII.



**C**um ex retentione menstruorum magna sequitur passio, trocisci de myrrha dētur, qui ꝑ. myrrhæ drachmas tres, lupinorū optime tritorum drachmas quinque, foliorum rutæ, mentastri, pulegij, cimini, rubæ de quatingitur, assæ, serapini, opopanaci, omnium ana drachmas duas, in formam trocisci ponderantes drachmas duas: ex quibus detur vnus in die cum aqua in qua semen iuniperi coctum fuerit. Hoc nanque medicamen adeo vehemens existit in prouocandis menstruis, vt etiam foetum excutiat, si qua eo sæpe vtatur. Ventosæ quoque sub curuatura poplitis sunt ponendæ, & phlebotomia ex saphena faciēda est. Postremo quoque ventosæ femori sunt superponendæ.

De ragadijs seu scissuris vuluæ aut matris  
cis. Cap. LXXIIII.

**H**æ curandæ sunt ex medicamine ragadiarum ani. Pessarium quoque ex adipē anatis & hyssopo, ceroto, & medulla cruris ceruini, mixtis cum cera dissoluta in oleo de lilio, aut narcissino subiiciatur, si neque febris neque acuitas affuerint. Quod si illud fuerit cum calore & acuitate, oleum rosatum adhibeatur. Ex vnguento quoque de cerusa similiter fiat pessarium. Si autem calor fuerit vehementior, sumatur succus portulacæ, aut lactucæ, aut muscilago psyllij, & fiat tabula de plumbo similis marmorī in quo teruntur colores, habens in circuitu labium paruum, & ponatur in ea aliquid de prædictis succis, & cum pistello, plumbeo a-

ded super ipsam moueatur, vt de plumbo multum prædicto liquori misceatur, & inspissetur succus, ex quo fiat pessarium, postquam oleum rosatum ei admixtum fuerit, & supponatur. Hoc enim medicamē canero vulnerato qui est in matrice, optimū existit, & alijs ei similibus.

De apostematibus vuluæ seu matricis.

Caput LXXXV.

**S**I cum apostematibus istis adest calor & febris, phlebotomia ex \* basilica fiat, & \* Alias patiens aqua hordei nutriatur, & linian. cephalis tur renes, & femur, & ilia, & lumen ex episc. ca. thimate apostematis calidi, & infrigidetur locus quantum possibile est. Si verò postquam febris & acuitas quieverint, & remanserit ex apostemate calido aliquid, ex inunctionibus liquidis curetur, & mulier in huiusmodi liquidis sedeat donec mollescat & maturetur. Pessarium mollificans dura apostemata matricis, & conferens doloribus in ea factis, & paulatim eos quiescere faciens. Recipe adipis anatis, medullæ cruris ceruini vel vaccini, bdellij mollis, croci, vitelli oui affati, fæcis olei de seminibus lini, fæcis olei de lilio, omnium ana partes æquales: dissoluantur in vino aut rob, & fiat ex his pessarium, est enim optimum ad sedandum dolorem, & mollificandam duritiem matricis. Patiēs præterea sedeat in aqua in qua cocta sint fœnum græcum & semen lini, & camomilla, & melilotū, & caulium extremitates, singillatim, aut omnia simul.

De viceribus, apostematibus, & cancro matricis. Cap. LXXXVI.

**C**um à vulua fluxerit sanies spissa, aut virus tenuē, si ex propinquo manat loco, neque fuerit ibi profunditas foetida neque putrida, sumenda sunt aloës, & myrrha, & sanguis draconis, & sarcocolla, atque olibanum, & loco superponenda donec consolidetur. Si autem ex loco manauerit remoto, ex pessario, quod nominauimus in capitulo de sanguine & sanie, fiat prodifinia. Si autem quod fluxerit est foetidum, odorem habens malum, ex pessario secundo acuto fiat iniectio, postquam locus mundificatus fuerit, ex aqua & melle iniectis per instrumentum æneum. Si verò cum hoc quod fluit, affuerint punctio & dolor & apostema durum, quod tactu discernitur, summopere cauendum est, ne aliquo acuto medicamine tangatur. Sed fiat iniectio ex confricatione plumbi, quam diximus, aut ex vnguento de cerusa, & phlebotometur ex basilica. Et custodiatur ab omnibus quæ choleram gignunt nigram, & feminibus & speciebus quæ pro condimento admiscuntur cibis.

De præfocatione matricis. Cap. LXXXVII.

**C**um menstrua per longum temporis spatium retenta fuerint, aut mulier à commixtione viri diu abstinuerit, licet valde affectauerit, & euenerit grauitas & dolor in inferioribus partibus, & suminis, & senserit quasi aliquid sursum trahi à parte suminis, fortasse post ista superueniet ei syncopis, & quasi mortua cadet: perpendi quoque vix poterit, & ipsa

\* Aliàs  
femoris.

attrahat aërem, vel habeat pulsum, & forsitan  
 prefocabitur & morietur, & fortasse sanabitur,  
 laboriose tamen. Hęc itaq; passio ilico vt euene  
 rit curanda est. Cuius curatio est, vt pedes for  
 titer fricentur & ligentur, & ventosa magna  
 sumini superponatur. Obstetrici quoque præci  
 piatur, vt digitum oleo bene redolēte inungat,  
 & in circuitu oris vuluæ dum est intus bene cō  
 moueat. Naribus præterea conditi insuffletur,  
 & circa aures ipsius voces clamando proferan  
 tur, & nihil quod bene redoleat olfaciat, imò be  
 ne redolentia & algalia remoueantur. Et pectē  
 & eius superiora ex eis epithimentur, & narib⁹  
 malum reddentia odorem applicentur, vt sters  
 cus & castoreum & sulphur. Cum autem sanī  
 tati restituta fuerit, ex hoc medicamine curetur,  
 ne ægritudo redeat. Quòd si ægritudo hęc post  
 menstruorum euenerit restrictionem, ea dentur  
 quæ menstrua prouocant. Et in pedibus fiat mi  
 nutio, & ventosæ in eis apponantur. Si autem  
 post longam viri \* disiunctionem cōtingat, ex \* Aliàs  
 quo etiam sæpius accidit, incipiat viri consue- *disuetu*  
 tudinem habere, aut obstetrix iteret illud sæpe *dinem.*  
 quod prædiximus in omni pauco tempore: aut  
 medicamina quæ minuunt sperma, dentur, quæ  
 prædiximus. Et dētur trocisci de myrrha, quos i  
 capsulo de mēstruis prouocādis nominauimus.

De mola matricis. Cap. LXXXVIII.

**M**ulieribus plerunque accidit passio, ex  
 qua prægnantium dispositionis simili  
 tudinem incurrunt. Venter nanque cre  
 scit, & discoloratę fiunt, & retinentur mēstrua.  
 Motus tamen qui est in hac ægritudine, non est

vt motus infantis, imo quandoque de suo mouetur loco, cum durius tangitur. Ad vltimum verò cum angustia & dolore frustum carnis informis, ac si parerent, emittunt. Plerunque verò solummodo ventositas & humorum multitudo emittitur, & deinde minuitur venter, & remouentur accidentia. Postquam ergo tempus præterierit, in quo scitur puerum debere moueri, si adesset, troisci de myrrha dandi sunt, & apozima de seminibus, & oleum de \* cheisim adhibendum, pessarium ex ruta & mēastro, & alia pessaria prædicta in capitulo de alleuiatione partus, sunt immittenda. Doses quoque de pilulis foetidis frequenter tribuendæ sunt, cū hoc enim cito euadent.

\* Aliàs  
crasin,  
id est, de  
balsa  
mo,

De hernia & eminentia & ruptura inguinis.  
Caput LXXXIX.

**C**Um aliquis in mirach ventris habuerit eminentiam, quæ, cum supinus iacuerit, & cum leuiter locus digitis comprehensus fuerit, remouetur: & cum sederit, redibit: passio adest quæ ruptura dicitur. Qui hoc itaque patitur, sibi cauere debet ne post comestionem moueatur, neque comedat fabas, & hoc præcipue, neque phaseleos, neque lentes, neque olera, neque aliquem cibum inflatium. Studere etiam debet, vt eius venter semper mollis sit. hoc namque regimine possibile est ipsum euadere dolorem. Loco præterea aliquod superponendum est obstaculum, & stringendum: & proprie, cum se mouere voluerit. Grossus quoque si fuerit, & ventrem habuerit grauem, non debet vti motu, nisi venter prius sub ymbilico à pla cingatur. fascia.

\* Aliàs  
crasin,  
id est, de  
balsa  
mo,

Emplastrū ad rupturam, Recipe gallarum cy-  
 pressi partes duas, myrrhæ, cyperī, sansuci, gal-  
 lorum, acaciæ, olibani, gummi arabici, omnium  
 ana partem vnam. gummæ prius in vino resol-  
 uantur, & aggregentur cum eius reliqua, & su-  
 per rupturam, ægro supino iacentē, ponantur:  
 & stringatur locus, & non solvatur vsque ad \*  
 tres vel quatuor dies. Postea ægro supino iacen-  
 te, solvatur, & illo reiecto, de eodem emplastro  
 superponatur, ex hoc enim prohibetur amplia-  
 ri. In ruptura autem testiculorum pellis oscei  
 augmentatur: quod fit aut propter ventositatē,  
 aut propter aquam, quæ ibi congregatur, aut  
 quia intestina descēdunt ad locum illum. Si ve-  
 rò propter descensum intestinorum contingat,  
 erit grauis & dolorosus, & sentiet dolorem cum  
 tangetur. Taliter itaque patiens, sicut prædixi-  
 mus, regendus est, & emplastrum prædictum  
 superponendum, & locus ligatura assiduē est  
 stringendus. Ruptura enim cum nō stringitur,  
 dilatatur & augmentatur semper. Si autem cau-  
 sa aquæ fiat, locus apparet lucidus, & tersus &  
 tensus. Huic itaque confert epithimari ex epi-  
 thimate, quod in Capitulo de Hydropisi nomi-  
 nauimus. Aqua quoque in hac ægritudine ples-  
 runque petit inferiora, & fluit inde: vnde æger  
 per aliquod tempus sanus efficitur, sed postea re-  
 dit ægritudo. Postquam ergo aqua fluxerit, cu-  
 randus est æger ex cauterio & medicamine. Ex  
 hoc enim prorsus curabitur, nec ægritudo redi-  
 bit. De hoc tamen loqui plus est quàm hic nos-  
 ter exigat liber. Cum autem hæc ægritudo  
 ventositatis causa cōtingat, locus fricandus est,

\* Aliàs  
 sex aut  
 septem,

& ex oleo sambucino, in quo castoreum & euphorbium dissoluta fuerint, inungendus: & ex eodem intus in virgam guttatim distillādū est.

De Podagra, arthretica, & sciatica.

Caput X C.

**C**Um in iuncturis fuerit dolor & apostema: & locus cum tangitur, fuerit tactu calidus, & color rubeus, æger si dolet in dextro pede, ex dextra manu: & si in sinistro, ex sinistra est phlebotomādus, & locus ex hoc medicamine liniendus. Epithima & rosarum rubearum, sandali, faufel, sief memithæ, boli armeni, opij, omnium partes æquales. Ex istis in aqua & aceto dissolutis fiat epithima. Psyllium quoque aceto infusum in charta missum de panno superponatur, & cum tepuerit, mutetur, & loco eius aliud superponatur. Venter præterea ex apozimate mirobalanorum, & hermodactylorum soluatur. Apozima mirobalanorum cum hermodactylis. Recipe mirobalanorum citrinorum drachmas quindecim, pulueris turbith fricati, polipodij, amborum ana drachmas tres, sene, seminis fumi terræ, amborum ana drachmas quatuor, hermodactyli albi, seminis endiuizæ, seminis apij, rosarum, omnium ana drachmas duas. coquantur in tribus libris aquæ donec ad vnam redeant, deinde manibus fricentur, & colentur, & bibantur cum zuccari taberzet drachmis decem. Si quis apozima fastidierit, pilulas istas sumat: quæ in lecto iacentes surgere & incedere faciunt, & pedibus ambulare. Pilulæ quæ non valentes incedere, surgere faciunt. & aloës drachmam vnam, scamoneæ quartam

partem drachmę vnius, rosarum rubearum tristarum sextam drachmę vni<sup>9</sup>, hermodactilorū alborum drachmam semis. informentur ex eis pilulę, quę erunt dosis vna. Aeger verò nutriatur ex cibis frigidis & stipticis, & abstineat à vino & cōfectionib<sup>9</sup> quę ex melle fiūt & carne.

Cum autem apostematis calor quieuerit, & eius inflammatio ex his quę calidorum apostematum reliquias resoluunt, curetur. Quorum vnum, Recipe ceram in oleo de lilio resolutam, cui admisceatur muscilago fœnugręci, & seminis lini, deinde terantur simul donec vniantur, & fiat ex eis epithima. In tempore autem suę incolumitatis, & proprię circa tempus. In quo ægritudo eum inuadere consueuit, & quàm maxime in vere, assuescat phlebotomia vti, & ventris solutione, ex his quę choleram expellūt rubeam, & à potu vini abstineat: & à comestione eorū quę ex melle conficiuntur, & à carne, & sint eius cibaria acetosa, & stiptica, & his similia ex his quę infrigidant. Membra autem quę hanc consueuerunt incurrere passionem, minus solito laborem pati assuescant, & præcipuē cum tempus inuasionis timetur, & cū corpus fuerit plenum, & venę plenę, & fuerit diu ex quo neq; minutus neq; solutus fuerit.

Cum autem cum dolore iuncturarum neque calor neque rubor in colore affuerit, fueritque æger frigidę complexionis: & locus tactu sentitur frigidus: in principio curationis eius pilulę maiores de hermodactilis dandę sunt. Pilulę maiores de hermodactilis. & hermodactilorum, satyrion, meizahara, omniū ana drachmas



quinq; hieræ pigræ drachmas decem, coloquin-  
 tidæ, ceutaureę minoris, amborū ana drachmas  
 quinq; euphorbij drachmas duas, turbith dra-  
 chmas decem, seitaragi indi, zinziberis, sinapis,  
 piperis, castorei, omnium ana drachmam vnā.  
 Informentur ex eis pilulæ, ex quibus à duabus  
 drachmis & media, ad tres sumantur. Hæ nāq;  
 pilulæ valde conferunt: quia non valentes sur-  
 gere, incedere faciunt. Epithima ad podagram  
 frigidam. Recipe storacis liquidæ, castorei, eu-  
 phorbij, myrrhæ, aloës, acaciæ, omnium partes  
 æquales: ex his omnibus vino veteri admixtis  
 fiat epithima. Cūmq; iste dolor quieuerit, suc-  
 curratur patienti, ex distillatione multæ aquæ  
 calidæ ab alto: & inunctio fiat ex oleo de lilio,  
 & emplastrū ex bdellio molli & storace, ac fœ-  
 nigræco, & semine lini, & armoniaco, superpo-  
 natur, quod hoc modo conficiatur. Armoniacū  
 & bdellium in vino veteri resoluantur, & alia  
 omnia eis admisceantur, ex quibus fiat empla-  
 strū, & superponatur. Hæc nanque ægritudinis  
 species est, quę in lapidis duriciē transit, & red-  
 dit membra & iuncturas fungis similia. Quæ  
 propter hanc habens passionem à fastidio &  
 ab aqua frigida, & à cibis grossis, & à frequen-  
 ti ebrietate custodiatur, eique præcipiendum,  
 vt dum sanus est, motu vtatur, & à coitu absti-  
 neat, & præcipuē cum satur fuerit: neque bal-  
 neum ingrediatur, neque exercitetur post com-  
 estionem. Vinum præterea vetus & purum bi-  
 bat. Eis quoque dum sanus est, vtatur quæ vri-  
 nam prouocare consueuerunt.

Dolor verò qui sciaticus vocatur, est qui ab

ancha per coxā totam vsq; ad genu in lōgitudi  
 nem protēditur. Quādoq; etiā in lōgitudine ad  
 virgæ similitudinē extensus, per crus vsq; ad pe  
 des descendit : & tunc si in complexione fuerit  
 caloris dominiū, & vrinæ tinctura, ex basilica  
 manus eiusdem partis prius minutio facienda  
 est, deinde ex sciatica. Si autem ægri cōplexio  
 frigida fuerit, & color fuscus, sæpe prouocan  
 dus est vomitus ex apozimate raphani cū syru  
 po acetoso. Coxa quoq; ac pes & crus, ex oleo  
 in quo castoreū & euphorbium, & storax sint  
 resoluta, inungantur assidue. Q; si dolor in coxa  
 mansiuus fiat, æger ex almuri, nabati, & bau  
 rach clysterizetur, & ex enemate acuto, quod in  
 capitulo de apoplexia nominauimus. Collyriū  
 quoq; ex ciclamine, & colocintida factū sup  
 ponatur. quod eo vsq; fieri cōuenit, donec æger  
 excoriationē incurrat, ex ea enim, dum accidit,  
 plerunq; cōsequitur sanitas. Si autē passio inue  
 terauerit, sinapis sumatur, & cū fimo colūbino  
 eiusdem quātitatis teratur, & ex apozimate fi  
 cū conficiātur, ex quibus coxæ emplastrū su  
 perponatur, quod tādīu dimittatur donec in lo  
 co vesicæ plenæ aqua fiant, & scindantur, & ef  
 fluat aqua quæ in eis est, & vaporetur. locus cū  
 aqua calida. Deinde æger per aliquot dies qui  
 elcere dimittatur, & si nondū sanitati restitutus  
 fuerit, ad hāc eandē curā redeundū est. Quod si  
 ægritudo valde mansiua fuerit & longi tempo  
 ris, & timetur ne vertebrum profiliat aut egres  
 sum fuerit, locus ex instrumēto, quod rotæ affi  
 milatur cauterizādus est: & intēdatur cū coctur  
 ra super caput anchæ apud caput coxę ponēda.

Huius tamē rei fermocinatio istius nostri operis metas transcendit. Taliter præterea patientes in tempore sospitatis vomere cōsueſcant, & ſoluere ventrē, & regimen ſubtiliare, & à cibis groſſis & frequenti ebrietate abſtinere.

De Gibboſitate, cum fieri incipit. Cap. XCI.

\* Aliàs  
raſim.

**C**um gibboſitas fieri incipit, pilulę maiores hermodactilorum dandę ſunt, & oleum de \* cheiſim cum apozimate de ſeminibus ſæpe ſumendum. Locus quoque ex oleo ſambucino, in quo ſtorax liquida, & caſtoreum, & euforbiū reſoluta ſint, frequenter inungendus: & à cibis frigidis & groſſis abſtinendum. Aqua etiam calida in qua cocta ſint mentaſtrū & ſanſucus, & ſticados arabicus, ab alto ſuper locum diſtillanda eſt, deinde frequēs fricatio, & inunctio ex oleis calidis facienda eſt. Quod ſi is qui hanc patitur ægritudinem, puer fuerit, balneum ſolummodo & inunctiones ex his quę prædiximus ſufficiunt. Si autem cum gibboſitas incipit, affuerit febris, à prædicto regimine omnino abſtinendum eſt, ſed apozima ex herbis factum cum caſſia fiſtula in potu eſt tribuendum. phlebotomia quoq; ex baſilica facienda eſt, & emplaſtra vehementia loco ſuperponenda ſunt.

De varicibus. Cap. XCII.

**C**um venę groſſę & plenę & diuerſo modo curuatę, & virides in crure apparuerint, ægritudo quę vitis vocatur, aſſeſſe ſignificatur. Hęc autem ægritudo frequentius accidit his, qui multum pedibus laborare conſueuerunt, & qui cibaria choleram nigram ge-

nerantia frequenter sumunt. In principio itaq; curationis huius passionis, basilicam minuere conuenit, & uentrem, ex his quæ choleram educunt nigram, soluere: quorum mentionem fecimus in capitulo de melancholia. Hæc autē sæpe facienda sunt, & ab omnibus à quibus melancholiam patientes custodiuntur, in hac ægritudine abstinendum est. Postquam verò hoc regimen diu adhibitum fuerit, ex venis quas in crure apparuisse diximus, minutio fiat: à quibus sanguis tam diu fluere dimittatur, donec quicquid in eis est, euacuetur. Deinde huiusmodi patientis choleram nigram expellentibus utatur, & ex basilica minuatur, & caueat sibi ab omnibus quæ choleram generant nigram.

De elephantia. Cap. XCIII.

**H**æc passio postq̃ māsua fuerit, incurabilis est. Cum autem incipit, si ei subueniatur, & ut debet, medicata fuerit, aut sanatur, aut manet sic, nihil addens. Cum ergo pedis grossities augeri videtur, & color obfuscar, venæ quoq; quæ vites vocantur apparere cœperint, æger assidue cogendus est vomere, & custodiendus à deambulatione nimia, & statione: & venter, vomitu præcedente, ex pilulis maioribus de hermodactilis soluendus est, deinde ad vomitum redeundum post illud. Hoc quoque multoties fieri oportet. Aeger præterea à cibis grossis est abstinendus, & tibia à calcaneo ineipiendo sursum vsq; ad genu stringenda ante tamen constrictionem epithimanda est ex aloë & myrrha, & acacia, & hypoquistidos, & alumine cum aceto forti dissolutis. Ex basilica quoque

manus contrariæ partis minutio facienda est. Neque erectus stet, nisi pes prius striçte ligatus fuerit, neq; epithima villo modo dimittat. Vomitu quoq; frequenter vtatur. Quod si paruum intercesserit spatium à præcedenti vomitu, & appetit quiescere, vapora ipsum cum seminibus caulium, & sticados arabico, cinere de vitibus, & lupinis, & nitro, & stercore caprino, & farina foeni græci, & liniatur etiam ex aqua cineris per spatium vnus diei aut duorum. Ipsa enim huius ægitudinis maximam resoluit partem, aut leuiorem reddit.

De rubore & vlceratione lumborum, seu renum. Cap. XCIII.

**C**Um aliquis longo tempore supinus super dorsum iacet, loca renum plerunque rubent, & mala ibi fiunt vlcera. Cum ergo loca ista rubere cū augmento visa fuerint, milium siue panicum aut folia salicis sub eo sternaenda sunt: & ipse in die multoties est eleuandus. loca quoque quæ rubent aqua rosata super niuem infrigidata, roranda sunt, & flabellanda. Quod si calor perseverauerit, imponatur epithima de alhubrati, quod in capitulo de apostematib<sup>9</sup> nominauimus. Et si vesicæ & vlcera ibi exorta fuerint, ex vnguento de cerusa curentur.

De doloribus exteriorum siue extremorum membrorum. Cap. XCV.

**C**Um dolor in manu aut pede sit, æger interrogandus est si ex percussione hoc ei accidit, aut si aliquid super ipsum membrum cecidit, aut si super ipsum diu iacuit, aut si contigit ex causa extrinsecâ. Si autem ab ex

teriori causa non contigerit, locus dolens considerandus est, an sit magis rubeus, quàm reliquū corpus, aut non. Si enim toto corpore rubicundior fuerit, ex calidi apostematis medicamine curandus erit. Et si membrum neq; fuerit calidum, neq; rubeum, sed iam quotidie obfuscatur & siccatur, aqua calida ab alto est super ipsum distillanda: & ex oleo & cera resoluta inungendū, & dimittendum sic, donec dolor sedetur. Quòd si locus grossior videatur, & tactu etiā frigidior sentiat, frequenter erit fricandus, & aqua calida in qua sanfucus & camomilla, & sticados arabicus cocta fuerint, ab alto, vt diximus, super ipsum erit distillanda, & ex oleo de cheiri citrino inungendus. Regimen quoq; eius subtiliandum erit. Ipse verò multo vtatur exercitio, & in balneo fudet. Si autem ista non suffecerint, venter ex his solvatur, quæ humiditates educunt. Membrum præterea si tactu sentitur frigidum, fricetur prius, & deinde inungatur ex oleo costino & sambucino, & oleo de been tepidis & his similibus. Quòd si ista non suffecerint, ex vnguentis quæ in capitulo de paralyfi nominauimus, inungendum erit, donec sanetur.

Finis noni tractatus libri Rhasis ad Regem Almanforem.

**ELENCHVS BREVIS MORBORUM,** quorum signa, causas, & curationes, hoc libello explicantur.

Morbi cerebri & neruorum.	folio. 2.
Morbi oculorum.	11
Morbi aurium.	17
Morbi narium.	19
Morbi dentium.	21
Morbi gingiuarū, linguæ, vuulæ, & gutturis.	22
Morbi pectoris & pulmonis.	25
Tremores cordis.	28
Morbi stomachi.	29
Morbi epatis.	34
Morbi splenis.	36
Morbi ventris & intestinorum.	37
Morbi renum & vesicæ.	43
Morbi ani & matricis.	46
Morbi inguinum & testiculorum.	51
Morbi iūcturarum & mēbrorū exteriorum.	52